

Asthma bronchiale sowie COPD
Brustkrebs
Diabetes mellitus Typ 1
Diabetes mellitus Typ 2
Koronare Herzkrankheit einschließlich
des Moduls chronische Herzinsuffizienz



INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	11
1. DMP-Programme in Hamburg	11
2. Ziele der DMP	14
3. Qualitätssicherung der DMP-Programme	14
3.1. Strukturqualität	15
3.2. Prozessqualität.....	16
3.3. Reminder	20
3.4. Feedback-Berichte	20
4. Asthma bronchiale sowie COPD	22
4.1. Ziele im DMP Asthma bronchiale und COPD	22
4.2. Daten zu den teilnehmenden Leistungserbringern, den teilnehmenden Patienten und den übermittelten Dokumentationen	23
4.2.1. Daten zu teilnehmenden Leistungserbringern.....	23
4.2.2. Daten zu teilnehmenden Patienten	23
4.2.3. Daten zu den übermittelten Dokumentationen	24
4.3. Ergebnisse der Qualitätsziele im 1. Berichtshalbjahr.....	25
4.3.1. Notfallmäßige stationäre Behandlung	25
4.3.1.1. DMP Asthma bronchiale	25
4.3.1.2. DMP COPD	25
4.3.2. Überprüfung der Inhalationstechnik.....	25
4.3.2.1. DMP Asthma bronchiale	26
4.3.2.2. DMP COPD	26

4.3.3	Inhalative Glukokortikosteroide	26
4.3.3.1.	DMP Asthma bronchiale	26
4.3.3.2.	DMP COPD	27
4.3.4	Symptomkontrolle (DMP Asthma bronchiale)	27
4.3.5	Asthma-Schulung (Quote - DMP Asthma bronchiale)	27
4.3.6	Schulungen.....	28
4.3.6.1	DMP Asthma bronchiale	28
4.3.6.2	DMP COPD	28
4.3.7	Selbstmanagement (DMP Asthma bronchiale)	28
4.3.8	Raucher (DMP COPD).....	29
4.3.9	Exazerbationen (DMP COPD)	29
4.3.10	Überweisung zum Facharzt (DMP COPD)	30
4.3.11	Zusammenfassung	30
4.4	Ergebnisse der Qualitätsziele im 2. Berichtshalbjahr.....	30
4.4.1	Notfallmäßige stationäre Behandlung	30
4.4.1.1	DMP Asthma bronchiale	30
4.4.1.2	DMP COPD	31
4.4.2	Überprüfung der Inhalationstechnik.....	31
4.3.10.1	DMP Asthma bronchiale	31
4.3.10.2	DMP COPD	31
4.4.3	Inhalative Glukokortikosteroide	32
4.4.3.2	DMP Asthma bronchiale	32
4.4.3.3	DMP COPD	32

4.4.4	Symptomkontrolle (DMP Asthma bronchiale)	32
4.4.5	Asthma-Schulung (Quote - DMP Asthma bronchiale)	33
4.4.6	Schulungen	33
4.4.6.1	DMP Asthma bronchiale	33
4.4.6.2	DMP COPD	33
4.4.7	Selbstmanagementplan (DMP Asthma bronchiale)	33
4.4.8	Raucher (DMP COPD)	34
4.4.9	Exazerbationen (DMP COPD)	34
4.4.10	Überweisung zum Facharzt (DMP COPD)	34
4.4.11	Zusammenfassung	35
5	Brustkrebs	35
5.1	Ziele im DMP Brustkrebs	35
5.2	Daten zu den teilnehmenden Leistungserbringern und den teilnehmenden Patientinnen	37
5.2.1	Daten zu teilnehmenden Leistungserbringern	37
5.2.2	Daten zu teilnehmenden Patientinnen	38
5.2.3	Daten zu den übermittelten Dokumentationen	38
5.3	Ergebnisse der Qualitätsziele im 1. Berichtshalbjahr	39
5.3.1	Brusterhaltende Therapie (BET)	39
5.3.2	Sentinel-Lymphknoten-Biopsie	39
5.3.3	Nachbestrahlung	40
5.3.4	Her2/neu – Bestimmung	41
5.3.5	Adjuvante endokrine Therapie	41

5.3.6	Adjuvante Trastuzumab-Therapie	42
5.3.7	Adjuvante Chemotherapie	42
5.3.8	Bisphosphonat-Therapie	43
5.3.9	Lymphödem	43
5.3.10	Zusammenfassung	44
5.4	Ergebnisse der Qualitätsziele im 2. Berichtshalbjahr	44
5.4.1	Brusterhaltende Therapie (BET)	44
5.4.2	Sentinel-Lymphknoten-Biopsie	45
5.4.3	Nachbestrahlung	45
5.4.4	Her2/neu – Bestimmung	45
5.4.5	Adjuvante endokrine Therapie	46
5.4.6	Adjuvante Trastuzumab-Therapie	46
5.4.7	Adjuvante Chemotherapie	47
5.4.8	Biphosphonat-Therapie	47
5.4.9	Lymphödem	47
5.4.10	Zusammenfassung	48
5.5	Tumorstadien	48
6	Diabetes mellitus Typ 1	49
6.1	Ziele im DMP Diabetes mellitus Typ 1	49
6.2	Daten zu den teilnehmenden Leistungserbringern, den teilnehmenden Patienten und den übermittelten Dokumentationen	51
6.2.1	Daten zu den teilnehmenden Leistungserbringern	51
6.2.2	Daten zu den teilnehmenden Patienten	51

6.2.3	Daten zu den übermittelten Dokumentationen	52
6.3	Ergebnisse der Qualitätsziele im 1. Berichtshalbjahr	52
6.3.1	Hypoglykämie	52
6.3.2	Notfallmäßige stationäre Behandlung	52
6.3.3	Blutdruck ($RR \leq 139/89$ mmHg)	53
6.3.4	HbA _{1c} -Wert.....	53
6.3.5	Individueller HbA _{1c} -Zielwert.....	53
6.3.6	Albuminausscheidung	54
6.3.7	Nierenfunktion.....	54
6.3.8	Fußstatus	55
6.3.9	Thrombozytenaggregationshemmer (TAH)	55
6.3.10	Schulungen.....	55
6.3.10.1	Diabetes-Schulung (Quote)	56
6.3.10.2	Hypertonie-Schulung (Quote)	56
6.3.11.	Zusammenfassung	56
6.4	Ergebnisse der Qualitätsziele im 2. Berichtshalbjahr	57
6.4.1	Hypoglykämie	57
6.4.2	Notfallmäßige stationäre Behandlung	57
6.4.3	Blutdruck ($RR \leq 139/89$ mmHg)	57
6.4.4	HbA _{1c} -Wert.....	57
6.4.5	Individueller HbA _{1c} -Zielwert.....	58
6.4.6	Albuminausscheidung	58
6.4.7	Nierenfunktion.....	58

6.4.8	Fußstatus	58
6.4.9	Thrombozytenaggregationshemmer (TAH)	59
6.4.10	Schulungen.....	59
6.4.10.1	Diabetes-Schulung (Quote)	59
6.4.10.2	Hypertonie-Schulung (Quote)	59
6.4.11	Zusammenfassung	60
7	Diabetes mellitus Typ 2	60
7.1	Ziele im DMP Diabetes mellitus Typ 2	60
7.2	Daten zu den teilnehmenden Leistungserbringern, den teilnehmenden Patienten und den übermittelten Dokumentationen	61
7.2.1	Daten zu den teilnehmenden Leistungserbringern.....	61
7.2.2	Daten zu den teilnehmenden Patienten	61
7.2.3	Daten zu den übermittelten Dokumentationen	62
7.3	Ergebnisse der Qualitätsziele im 1. Berichtshalbjahr	62
7.3.1	Hypoglykämie	62
7.3.2	Notfallmäßige stationäre Behandlung	63
7.3.3	Metformin.....	63
7.3.4	Augenarzt.....	64
7.3.5	Diabetischer Fuss	64
7.3.6	HbA _{1c} -Wert.....	65
7.3.7	HbA _{1c} -Zielwert.....	65
7.3.8	Blutdruck.....	65
7.3.9	Nierenfunktion.....	66

7.3.10	Thrombozytenaggregationshemmer	66
7.3.11	Schulungen.....	67
7.3.11.1	Diabetes-Schulung (Quote)	67
7.3.11.2	Hypertonie-Schulung (Quote)	67
7.3.12	Zusammenfassung	67
7.4	Ergebnisse der Qualitätsziele im 2. Berichtshalbjahr.....	68
7.4.1	Hypoglykämie	68
7.4.2	Notfallmäßige stationäre Behandlung	68
7.4.3	Metformin.....	69
7.4.4	Augenarzt.....	69
7.4.5	Diabetischer Fuss	69
7.4.6	HbA _{1c} -Wert.....	69
7.4.7	Individueller HbA _{1c} -Zielwert.....	70
7.4.8	Blutdruck (RR ≤139/89 mmHg)	70
7.4.9	Nierenfunktion.....	70
7.4.10	Thrombozytenaggregationshemmer	70
7.4.11	Schulungen.....	71
7.4.10.1	Diabetes-Schulung (Quote)	71
7.4.10.2	Hypertonie-Schulung (Quote)	71
7.3.12	Zusammenfassung	72
7.5	Längsschnittdarstellung	72
7.5.1	HbA _{1c} -Werteklassen.....	73
7.5.2	Blutdruck-Werteklassen.....	74

8 Koronare Herzkrankheit einschliesslich des Moduls chronische Herzinsuffizienz.....	75
8.1 Ziele im DMP KHK einschliesslich des Moduls chronische Herzinsuffizienz	75
8.2 Daten zu den teilnehmenden Leistungserbringern, den teilnehmenden Patienten und den übermittelten Dokumentationen	76
8.2.1 Daten zu teilnehmenden Leistungserbringern.....	76
8.2.2 Daten zu teilnehmenden Patienten	76
8.2.3 Daten zu übermittelten Dokumentationen	77
8.3 Ergebnisse der Qualitätsziele im 1. Halbjahr	77
8.3.1 Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern (TAH).....	77
8.3.2 Therapie mit Betablockern	77
8.3.3 Therapie mit HMG-CoA-Reduktase-Hemmern (Statine).....	78
8.3.4 Blutdruck.....	78
8.3.5 Raucherentwöhnung	78
8.3.6 Raucherquote	79
8.3.7 Angina-pectoris-Beschwerden	79
8.3.8 Schulungen.....	80
8.3.8.1 Diabetes-Schulung (Quote)	81
8.3.8.2 Hypertonie-Schulung (Quote).....	81
8.3.9. Zusammenfassung	81
8.4 Ergebnisse der Qualitätsziele im 2. Halbjahr	82
8.4.1 Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern (TAH)	82
8.4.2 Therapie mit Betablockern	82

8.4.3	Therapie mit HMG-CoA-Reduktase-Hemmern (Statine).....	82
8.4.4	Blutdruck.....	82
8.4.5	Raucherentwöhnung	83
8.4.6	Raucherquote	83
8.4.7	Angina-pectoris-Beschwerden	84
8.4.8	Schulungen.....	85
8.4.8.1	Diabetes-Schulung (Quote)	85
8.4.8.2	Hypertonie-Schulung (Quote).....	85
8.4.9	Zusammenfassung	85
8.5	Längsschnittdarstellung der Blutdruck-Werteklassen	86
8.6	Modul Herzinsuffizienz	87
8.6.1	Ergebnisse der Qualitätsziele im 1. Halbjahr	87
8.6.1.1	Therapie mit ACE-Hemmern	87
8.6.1.2	Therapie mit Betablockern	87
8.6.1.3	Serum-Elektrolyte-Bestimmung	87
8.6.2	Ergebnisse der Qualitätsziele im 2. Halbjahr	88
8.6.2.1	Therapie mit ACE-Hemmern.....	88
8.6.2.2	Therapie mit Betablockern	88
8.6.2.3	Serum-Elektrolyte-Bestimmung	88
8.6.3	Zusammenfassung	89

EINLEITUNG

Unter Disease-Management (DMP) versteht man die auf eine chronische Krankheit bezogene systematische, prozessorientierte Versorgung des Patienten. Die Versorgung im DMP stützt sich dabei auf die Erkenntnisse aus der evidenzbasierten Medizin.

Ein DMP gibt die Behandlung von Krankheitsbildern anhand standardisierter Vorgaben wieder, bei der alle Therapieschritte wie ambulante und stationäre Behandlung, Rehabilitation und Pflege unter Einsatz von Leitlinien aufeinander abgestimmt werden.

In diesem Qualitätsbericht werden durch die Gemeinsame Einrichtung (GE) die Maßnahmen zur Qualitätssicherung in den DMP im Jahre 2018 zusammen gefasst und anhand der generierten Daten differenziert analysiert für die jeweiligen Indikationen. Dies umfasst z. B. auch Daten zu den beteiligten Ärzten, Einrichtungen und Patienten.

Die Mitglieder der GE bestehen aus den Mitgliedern der Hamburger DMP-Verträge. Ein besonderes Augenmerk erlangt die Frage, ob die im DMP definierten Qualitätsziele für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 erreicht wurden. Dies soll zu einer Aufrechterhaltung von erreichten Standards beitragen sowie einen Anreiz für weitere Verbesserungen in der Versorgungsqualität geben.

1. DMP-PROGRAMME IN HAMBURG

In Hamburg wurden fünf DMP kassenartenübergreifend mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KV Hamburg) vereinbart:

DMP Name	DMP Abkürzung	Vertragsgültigkeit
DMP Diabetes mellitus Typ 2	(DM 2)	ab 1. Juli 2003
DMP Brustkrebs	(BK)	ab 1. April 2004
DMP Koronare Herzkrankheit	(KHK)	ab 1. Februar 2006
DMP Asthma bronchiale sowie COPD	(AB/C)	ab 1. Juli 2007
DMP Diabetes mellitus Typ 1	(DM 1)	ab 1. Juli 2008

Stationäre Einrichtungen und Rehabilitationseinrichtungen werden über gesonderte Verträge mit den Hamburger Krankenkassen/-verbänden in die jeweiligen DMP eingebunden. Im Berichtsjahr 2018 waren das folgende Einrichtungen:

DMP	Stationäre Einrichtung	Rehabilitationseinrichtung
DM 2	• Asklepios Klinik Barmbek • Asklepios Westklinikum Hamburg • Agaplesion Diakoniekrankenhaus Hamburg	• Klinik Buchenholm
BK	• Asklepios Brustzentrum Hamburg (Asklepios Klinik Barmbek) • Brustzentrum des Agaplesion Diakoniekrankenhaus Hamburg (Agaplesion Diakoniekrankenhaus Hamburg) • Brustzentrum HELIOS Mariahilf - Hamburg • Brustzentrum am Marienkrankenhaus (Katholisches Marienkrankenhaus gGmbH) • Mammazentrum Hamburg (Krankenhaus Jerusalem) • Brustzentrum am UKE (Universitätsklinikum Eppendorf, bis 30.09.2018)	
KHK	• Asklepios Klinik Altona (bis 31.03.2018) • Asklepios Klinik St. Georg • Albertinen Krankenhaus • Universitäres Herzzentrum Hamburg	• Segeberger Kliniken GmbH [Reha] (ab 01.07.2015)
Asthma bronchiale	• LungenClinic Großhansdorf GmbH	• Ostseestrandklinik „Klaus Störtebeker“ (ab 01.07.2014)

	• Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift • Altonaer Kinderkrankenhaus • Asklepios Klinik Harburg • Universitätsklinikum Eppendorf (ab 01.10.2013)	• Strandklinik St. Peter-Ording GmbH & CO. KG (ab 01.07.2013)
COPD	• LungenClinic Großhansdorf • Asklepios Klinik Harburg • Universitätsklinikum Eppendorf (bis 31.12.2017)	• Strandklinik St. Peter-Ording GmbH & CO. KG (ab 01.07.2013)
DM 1	• Altonaer Kinderkrankenhaus • Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift • Asklepios Klinik Barmbek • Asklepios Westklinikum Hamburg • Agaplesion Diakoniekrankenhaus Hamburg	• Klinik Buchenholm • Inselklinik Heringsdorf Haus Gothensee ab 27.08.2014

Weitergehende Informationen zu den einzelnen Hamburger DMP-Verträgen stehen nebst Anlagen auf der Homepage der KV Hamburg unter www.kvhh.net zur Verfügung.

2. ZIELE DER DMP

Das übergeordnete Ziel der DMP ist die Optimierung der Versorgung der Versicherten durch eine Koordination der Behandlung einschließlich einer interdisziplinären Kooperation aller Leistungserbringer unterstützt von der aktiven Teilnahme des Versicherten.

Auf diesem Wege sollen Komplikationen und Spätfolgen der Erkrankung vermieden bzw. verzögert und damit die Lebenserwartung bei gleichzeitiger Verbesserung der Lebensqualität des Versicherten erhöht werden.

Ziele und Anforderungen an die einzelnen strukturierten Behandlungsprogramme, deren Ausgestaltung sowie die medizinischen Grundlagen, sind in der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (RSAV) definiert. Ergänzend dazu, gelten die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Diese engen Vorgaben bilden die Basis für die, auf der Landesebene von den Vertragspartnern abzuschließenden DMP-Verträgen, die beim Bundesversicherungsamt (BVA) zur Akkreditierung bzw. Zulassung eingereicht werden müssen.

3. QUALITÄTSSICHERUNG DER DMP-PROGRAMME

Die Umsetzung der zentralen Ziele und Intentionen, die mit dem DMP verbunden sind, werden durch die Qualitätssicherung gewährleistet. Gemäß der RSAV bzw. der DMP-Anforderungen-Richtlinie des G-BA sowie der vertraglichen Regelungen in Hamburg umfasst dies folgende Bereiche:

- Überprüfung der vereinbarten Anforderungen an die Strukturqualität der Leistungserbringer
- Einhaltung der Behandlung nach evidenzbasierten Leitlinien einschließlich einer qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie
- Einhaltung der Kooperationsregeln der Versorgungsebenen
- Vollständigkeit, Qualität (Plausibilität) und Verfügbarkeit der Dokumentationen (z. B. Wahrnehmung von vertraglichen Kontrollrechten der Vertragspartner gegenüber der Datenstelle)
- aktive Teilnahme der Versicherten (z. B. Teilnahme an Schulungen)

Zur Erreichung der genannten Qualitätsziele werden unterschiedliche Instrumente und Maßnahmen eingesetzt, deren Anwendung ein wesentlicher Bestandteil des DMP ist. Eine hohe Struktur- und Prozessqualität bei der Versorgung der eingeschriebenen Versicherten wird durch die Definition von Teilnahmevoraussetzungen, medizinischen Inhalten und Kooperationsregeln sichergestellt. Des Weiteren wird über die vom behandelnden Arzt regelmäßig erstellte Dokumentation des Behandlungsverlaufs, die Formulierung und Messung von Qualitätssicherungszielen sowie die Rückmeldung von qualitätsrelevanten Daten (Feedback-Berichte) an die teilnehmenden Ärzte ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess in Gang gesetzt. Die Qualitätssicherung ist Aufgabe der Gemeinsamen Einrichtung (GE) und wird auf der Basis der von der Datenstelle übermittelten Daten aus den DMP Dokumentationen, welche die Ärzte regelmäßig für ihre eingeschriebenen Patienten erstellen, durchgeführt. Die Aufgaben der GE sind hier insbesondere:

- die Unterstützung bei der Erreichung der Qualitätsziele, insbesondere im Hinblick auf eine qualitätsgesicherte und wirtschaftliche Arzneimitteltherapie
- die Durchführung des ärztlichen Feedbacks
- die Unterbreitung von Empfehlungen an die Vertragspartner für die Entwicklung weiterer Maßnahmen zur Qualitätssicherung

3.1. STRUKTURQUALITÄT

Die DMP-Verträge - basierend auf gesetzlichen Vorgaben - regeln u. a. die Teilnahmevoraussetzungen der Leistungserbringer. Diese Kriterien beziehen sich auf die fachlichen und räumlichen bzw. die personellen Voraussetzungen einer Praxis bzw. einer stationären Einrichtung. In der RSAV bzw. der DMP-Anforderungen-Richtlinie des G-BA ist geregelt, welche Versicherten an diesen Programmen teilnehmen können. Eine Teilnahme ist sowohl für die Leistungserbringer als auch für die Versicherten freiwillig.

Vertragsärzte dürfen erst nach Genehmigungserteilung durch die KV Hamburg am DMP teilnehmen. Die Einhaltung der Strukturvoraussetzungen und die regelmäßige Fortbildung der teilnehmenden Ärzte werden von der KV Hamburg jährlich überprüft. Werden die Vertragsinhalte nicht erfüllt, können Ärzte von der Teilnahme am Programm ausgeschlossen werden.

3.2. PROZESSQUALITÄT

In der RSAV bzw. der DMP-Anforderungen-Richtlinie des G-BA werden die Anforderungen an die Durchführung des jeweiligen DMP festgelegt. Vorgaben trifft diese Regelungen dabei unter anderem hinsichtlich:

- der Diagnostik
- der Therapie (u. a. Basistherapie, konventionelle/interventionelle Maßnahmen, Therapieziele, medikamentöse Therapie)
- der Kooperationen der Versorgungssektoren
- der durchzuführenden qualitätssichernden Maßnahmen
- der Teilnahmevoraussetzungen für Versicherte und deren Zugang zu Schulungen

Der G-BA hat die Vorgaben seiner Richtlinien regelmäßig wissenschaftlich zu überprüfen. Relevante DMP-Änderungen der RSAV sowie weitere gesetzliche Vorgaben bis Ende 2018 sind:

RSAV	In Kraft ab	Wesentlicher Regelungsinhalt
4. RSA-ÄndV	1. Juli 2002	- rechtliche Grundlage für das DMP Diabetes mellitus Typ 2 und das DMP Brustkrebs - Anlagen beinhalten Anforderungen an Programme, evidenzbasierte Leitlinien, Erfassungsdaten (Erstdokumentation)
6. RSA-ÄndV	1. Januar 2003	- Anpassung der Dokumentation des DMP Diabetes mellitus Typ 2 sowie die Reduzierung des Datenaustausches
7. RSA-ÄndV	1. Mai 2003	- rechtliche Grundlage für das DMP Koronare Herzkrankheit (KHK)
9. RSA-ÄndV	1. März 2004	- rechtliche Grundlage für das DMP Diabetes mellitus Typ 1 - Vereinfachung der Abläufe und Dokumentation für das DMP Diabetes

		mellitus Typ 2 und KHK
11. RSA-ÄndV	1. Januar 2005	- rechtliche Grundlage für das DMP Asthma bronchiale und das DMP chronische obstruktive Lungenerkrankungen (COPD)
12. RSA-ÄndV	1. September 2005	- Anpassung des DMP Diabetes mellitus Typ 2 (Anlage 1 RSAV) an neueste medizinische Erkenntnisse - Verfahrensvorschrift zur Übermittlung von Dokumentationsdaten im DMP
13. RSA-ÄndV	1. Februar 2006	- Anpassung des DMP Brustkrebs an neueste medizinische Erkenntnisse - überarbeitete Dokumentation für das DMP Brustkrebs - ergänzende Regelungen zur elektronischen Dokumentation und zur Evaluation der Programme
GKV-WSG	1. April 2007	- Verlängerung des Zulassungszeitraumes von 3 auf 5 Jahre - Verfahrensvereinfachungen z. B. bei den Einschreibevoraussetzungen, den Übermittlungsfristen und den Mitwirkungspflichten für teilnehmende Versicherte
17. RSA-ÄndV	1. April 2008	Regelungen: - zu einer vereinfachten, indikationsübergreifenden Dokumentation für alle DMP - zur elektronischen Dokumentation - zur Evaluation und Qualitätssicherung
18. RSA-ÄndV	19. November 2008	- Die Frist zur Übermittlung der DMP-Dokumentationen aus dem 3. Quartal 2008 wurde um ein Quartal verlängert

		(von 12 auf 15 Monate) - Ausnahmeregelung
20. RSA-ÄndV	1. Juli 2009	- Anpassung des DMP Diabetes mellitus Typ 2 (Anlage 1 RSAV) - Anpassung des DMP KHK sowie die Aufnahme des Moduls Herzinsuffizienz (Anlage 5 RSAV) - Anpassung DMP Diabetes mellitus Typ 1 (Anlage 7 RSAV)
23. RSA-ÄndV	17. Dezember 2010	- Übergangsregelung zur weiteren Aufbewahrung von DMP-Daten (Löschungsfrist)
GKV-VStG	1. Januar 2012	- Unbefristete Zulassung - Übertragung der Richtlinienkompetenz auf den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
DMP-RL	19. Juli 2012	- Anforderungen an die Ausgestaltung der DMP zu den Indikationen Brustkrebs, Asthma bronchiale und COPD
DMP-AF-RL	3. Oktober 2012	- Verlängerung der Aufbewahrungsfrist für DMP-Daten auf 15 Jahre - Die Richtlinie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2018 wieder außer Kraft
DMP-A-RL	1. Juli 2014	- Anforderungen an die Ausgestaltung der DMP zu den Indikationen Diabetes mellitus Typ 1 und KHK
DMP-A-RL	19. September 2014	- Regelungen zu Anforderungen an die Qualitätsberichte und die Evaluation
DMP-RL	19. September 2014	- Verweis auf § 6 DMP-A-RL (Evaluation) für die Indikationen Brustkrebs, Asthma

		und COPD
DMP-RL	7. Januar 2015	- Änderung (redaktionell) in Teil B II, Nr. 5 und Teil III Nr. 5
DMP-A-RL	19. März 2016	- Änderung der Anlage 2 (indikationsübergreifende Dokumentation)
DMP-A-RL	1. Juli 2016	- Änderung der Anlage 1 (Diabetes mellitus Typ 2) und Anlage 8 (Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 – Dokumentation)
DMP-A-RL	1. Januar 2017	- Ergänzung der Anlage 11 (COPD) und Anlage 12 (COPD – Dokumentation)
DMP-A-RL	1. April 2017	- Änderung von § 4 (Schulungsanforderungen) sowie Anlage 2, 5 und 6 (Dokumentation: indikationsübergreifend, Brustkrebs und KHK)
DMP-A-RL	6. Mai 2017	- Streichung der Anlage 5a (Herzinsuffizienz)
DMP-A-RL	1. Juli 2017	- Änderung der Anlage 1 (Diabetes mellitus Typ 1)
DMP-A-RL	1. Oktober 2017	- Ergänzung der Anlage 3 (Brustkrebs) und Anlage 4 (Ergänzung Brustkrebs)
DMP-A-RL	18. November 2017	- Änderung (redaktionell) der Anlage 11 (COPD)

3.3. REMINDER

Die Datenstelle DAVASO GmbH versendet im Auftrag der GE quartalsweise an die Leistungserbringer Reminder. Dieser erinnert die Ärzte daran, fehlerhafte bzw. ausstehende Dokumentationen innerhalb des Dokumentationszeitraums (quartalsweise/halbjährlich) an die Datenstelle zu senden. Damit soll die regelmäßige Teilnahme der Versicherten an den Programmen unterstützt werden.

Die Reminder nehmen jeweils Bezug auf vorhergehende Dokumentationen, in denen die nächsten Dokumentationsintervalle festgehalten sind. Da eine hohe Anzahl der Ärzte sich in mehreren DMP eingeschrieben haben, hat DAVASO GmbH die Prozessabläufe dahingehend geändert, dass die Folgedokumentationsreminder diagnoseübergreifend durchgeführt werden und die Anzahl über alle Indikationen gemeldet werden.

So wurden für das 1. Quartal 2018 über alle Krankheitsbilder **655** Reminder, für das 2. Quartal 2018 **663** Reminder, für das 3. Quartal 2018 **661** Reminder und im 4. Quartal 2018 **654** Reminder erstellt und an die Vertragsärzte versandt.

3.4. FEEDBACK-BERICHTE

Die Qualitätssicherung wird vorrangig über den Einzelbericht (Feedback-Bericht) an den Arzt geleistet. Dieser Bericht wird für jede Indikation halbjährlich von der GE erstellt und den teilnehmenden Ärzten zugesandt.

Anzahl der DMP-Feedbackberichte 2018

Indikation	1. Halbjahr	2. Halbjahr	Gesamt 2018
Asthma	405	398	803
Brustkrebs	16	16	32
COPD	374	375	749
DM 1	28	29	57
DM 2	518	518	1.036
KHK	494	492	986

In den Feedback-Berichten werden die Behandlungsdaten des einzelnen Arztes, die Vorgaben des DMP-Vertrages sowie die kumulierten Daten der übrigen am Vertrag teilnehmenden Ärzte ausgewiesen.

Alle relevanten Daten der vorliegenden DMP-Dokumentationen werden ausgewertet und jeweils die Daten der eigenen Praxis dem Durchschnitt aller teilnehmenden Praxen gegenübergestellt. Dadurch ist ein aussagekräftiger Vergleich der jeweiligen Praxis mit dem Praxisdurchschnitt möglich. In den Feedback-Berichten werden nur diejenigen Patienten berücksichtigt, für die mindestens zwei Dokumentationen vorliegen.

Zusätzlich werden dem Arzt die Patienten aufgelistet, bei denen die Qualitätsziele nicht erreicht wurden. Dies ermöglicht dem Arzt, bei diesen Patienten gezielt die bisherige Behandlungssystematik und den Krankheitsverlauf zu prüfen. Ziel ist es, etwaige Behandlungsmängel zu identifizieren und abzustellen. So ist der Feedback-Bericht ein praktisches Instrument zur Erreichung der Qualitätssicherungsziele.

4. ASTHMA BRONCHIALE SOWIE COPD

Bei Kindern ist Asthma bronchiale die häufigste chronische Erkrankung. COPD ist eine erworbene Atemwegserkrankung und tritt erst im Erwachsenenalter auf. Durch Selbstmanagement und Lebensstiländerung können die Patienten den Krankheitsverlauf selbst erheblich beeinflussen. In Patientenschulungen werden die Betroffenen für ihre Erkrankung sensibilisiert und lernen, aktiv an der Therapie mitzuwirken.

Für beide Erkrankungen wird eine Häufigkeit von 10-20 % der erwachsenen Population angenommen, mit einer Überschneidung aufgrund der diagnostischen Unschärfe. Für Deutschland kann daher von ca. 15 Millionen Patienten mit Asthma bronchiale bzw. COPD ausgegangen werden.

4.1. ZIELE IM DMP ASTHMA BRONCHIALE UND COPD

Die Vertragspartner streben im DMP Asthma bronchiale und COPD folgende Ziele an:

Vermeidung/Reduktion von:

- akuten und chronischen Krankheitsbeeinträchtigungen (z. B. Symptome, Asthma-Anfälle, Exazerbationen, Begleit- und Folgeerkrankungen)
- krankheitsbedingten Beeinträchtigungen der physischen, psychischen und geistigen Entwicklung bei Kindern/Jugendlichen
- krankheitsbedingten Beeinträchtigungen der körperlichen und sozialen Aktivitäten im Alltag
- einer Progredienz der Krankheit
- unerwünschten Wirkungen der Therapie
- bei Normalisierung bzw. Anstreben der bestmöglichen Lungenfunktion und Reduktion der bronchialen Hyperreagibilität
- Reduktion der Asthma bronchiale- bzw. COPD-bedingten Letalität

4.2. DATEN ZU DEN TEILNEHMENDEN LEISTUNGSERBRINGERN, DEN TEILNEHMENDEN PATIENTEN UND DEN ÜBERMITTELTEN DOKUMENTATIONEN

4.2.1. DATEN ZU TEILNEHMENDEN LEISTUNGSERBRINGERN

Am **DMP Asthma bronchiale** nehmen 758 Hausärzte, davon 61 Kinderärzte sowie 59 pneumologisch qualifizierte Ärzte, davon 16 pneumologisch qualifizierte Kinderärzte teil. Bei der jährlichen Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen haben 17 Hausärzte die erforderlichen Nachweise nicht erbracht.

Beim **DMP COPD** nehmen 694 Hausärzte sowie 41 pneumologisch qualifizierte Ärzte teil. Bei der jährlichen Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen haben 16 Hausärzte die erforderlichen Nachweise nicht erbracht.


Als stationäre Einrichtungen nahmen bis zum 31. Dezember 2018 **4** pneumologisch, davon **2** auch pädiatrisch qualifizierte Krankenhäuser und **3** Rehabilitationseinrichtungen am **DMP Asthma bronchiale** teil.

Am **DMP COPD** nahmen bis zum 31. Dezember 2018 **2** Krankenhäuser und **2** Rehabilitationseinrichtungen teil.


4.2.2. DATEN ZU TEILNEHMENDEN PATIENTEN

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 sind **25.255** Patienten in das **DMP Asthma bronchiale** und **14.087** Patienten in das **DMP COPD** eingeschrieben.

Wie sich die Altersstruktur der Patienten verteilt, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen. Die Patienten sind beim **DMP Asthma bronchiale** durchschnittlich **50 Jahre** alt.



Beim **DMP COPD** ist das Alter der Patienten durchschnittlich **68** Jahre.



4.2.3. DATEN ZU DEN ÜBERMITTELTEN DOKUMENTATIONEN

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2018 liegen für das **DMP Asthma bronchiale** **25.858** Patienten Dokumentationen vor. Davon **3.349** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **22.509** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation. Im Berichtszeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2018 liegen für **25.255** Patienten Dokumentationen vor. Alle diese Patienten wurden im Kernbericht berücksichtigt. Davon **3.819** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **21.436** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation.

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2018 liegen für das **DMP COPD** **14.253** Patienten Dokumentationen vor. Davon **1.401** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **12.852** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation. Im Berichtszeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2018 liegen für **14.087** Patienten Dokumentationen vor. Davon **1.629** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **12.458** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation.

4.3. ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 1. BERICHTSHALBJAHR

4.3.1. NOTFALLMÄßIGE STATIONÄRE BEHANDLUNG

Die Vermeidung von notfallmäßigen stationären Behandlungen ist ein wesentliches Therapieziel bei der Behandlung.

4.3.1.1. DMP ASTHMA BRONCHIALE

Das Qualitätsziel: Höchstens **10 %** der Patienten mit einer oder mehr notfallmäßigen stationären Behandlungen wegen Asthma bronchiale bei Betrachtung der letzten sechs Monate des DMP.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Im 1. Berichtshalbjahr wurden lediglich **132** Patienten von **19.329** Patienten (entspricht **0,7 %**) notfallmäßig behandelt.

Damit wurde das Ziel deutlich erreicht.

4.3.1.2. DMP COPD

Das Qualitätsziel: Höchstens **10 %** der Patienten hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen COPD innerhalb der letzten 12 Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Lediglich **425** Patienten von **10.562** Patienten (entspricht **4,0 %**) wurden im 1. Berichtshalbjahr notfallmäßig stationär behandelt.

Damit wurde das Ziel deutlich erreicht.

4.3.2. ÜBERPRÜFUNG DER INHALATIONSTECHNIK

In der Inhalationstherapie ist nur die im Bronchialsystem deponierte Medikamentenmenge wirksam. Diese hängt stark ab von der individuellen Anatomie der Atemwege, dem Atemmuster, der Partikelgröße und dem jeweiligen Applikationssystem.

4.3.2.1. DMP ASTHMA BRONCHIALE

Das Qualitätsziel: Bei mindestens **90 %** der Patienten wird die Inhalationstechnik im Berichtszeitraum überprüft.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit inhalativer Medikation.

Die Überprüfung der Inhalationstechnik fand im 1. Berichtshalbjahr bei **23.434** von **25.404** Patienten (entspricht **92,2 %**) statt.

Das Qualitätsziel wurde erreicht.

4.3.2.2. DMP COPD

Das Qualitätsziel: Bei mindestens **90 %** der Patienten wird die Inhalationstechnik im Berichtszeitraum überprüft.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Die Überprüfung fand bei **12.009** von **14.253** Patienten (entspricht **84,3 %**) statt.

Das Qualitätsziel wurde somit verfehlt.

4.3.3 INHALATIVE GLUKOKORTIKOSTEROIDE

Beim Einsatz inhalativer Glukokortikoide ist entscheidend, dass der Wirkstoff in die unteren Atemwege gelangt und sich nicht in der Mundhöhle oder im Nasenrachenraum niederschlägt. Um die richtige Inhalation zu unterstützen, werden so genannte Spacer eingesetzt.

4.3.3.1. DMP ASTHMA BRONCHIALE

Das Qualitätsziel: Mindestens **90 %** der Patienten werden inhalative Glukokortikosteroide als Bestandteil einer Dauermedikation verordnet.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit Verordnung einer Dauermedikation ohne Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide.

Das Ziel wurde im 1. Berichtshalbjahr mit **95,1% (20.979 von 22.055 Patienten)** erreicht.

4.3.3.2. DMP COPD

Das Qualitätsziel: Höchstens **10 %** der Patienten werden über zwei oder mehr aufeinander folgende Dokumentationen systemische Glukokortikosteroide verordnet.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Auch dieses Ziel wurde mit **1,0 % (130 von 12.928 Patienten)** im 1. Berichtshalbjahr sehr gut erreicht.

4.3.4 SYMPTOMKONTROLLE (DMP ASTHMA BRONCHIALE)

Mithilfe der Symptomkontrolle sollen Krankheitszeichen und mögliche Begleiterscheinungen möglichst schnell erkannt, erfasst und behandelt werden. Im Vordergrund stehen die Verbesserung der Symptomatik und Lebensqualität von Palliativpatienten.

Das Qualitätsziel: Hoher Anteil von Patienten mit guter Symptomkontrolle.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation.

90 % (15.438 von 17.158 Patienten) wiesen im 1. Berichtshalbjahr eine gute Symptomkontrolle auf.

Hinweis: Da dieses Qualitätsziel auf Ausprägungen des Dokumentationsparameters „Häufigkeit von Asthma-Symptomen“ in der Dokumentationsversion 3.x beruht, werden Dokumentationen der Vorversionen nicht berücksichtigt.

4.3.5 ASTHMA-SCHULUNG (QUOTE - DMP ASTHMA BRONCHIALE)

Asthmaschulungen tragen dazu bei, die Angst vor der chronischen Krankheit abzubauen, Wege aufzuzeigen und die Krankheit durch Verständnis zu bewältigen.

Das Qualitätsziel: Hoher Anteil von Patienten, die im Rahmen des DMP eine Asthma-Schulung erhalten haben.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Im 1. Berichtshalbjahr haben **8.389 von 25.858 Patienten** (entspricht **32,4 %**) eine Asthma-Schulung im Rahmen des DMP erhalten.

4.3.6 SCHULUNGEN

Jeder Patient soll Zugang zu einem strukturierten, evaluierten, zielgruppenspezifischen und publizierten Schulungs- und Behandlungsprogramm erhalten. Patientenschulungen dienen der Befähigung der Patienten zur besseren Bewältigung des Krankheitsverlaufs und zur Befähigung zu informierten Patientenentscheidungen.

4.3.6.1 DMP ASTHMA BRONCHIALE

Das Qualitätsziel: Mindestens **85 %** der Patienten haben eine empfohlene Asthma-Schulung wahrgenommen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, denen vier Quartale vor dem Berichtszeitraum eine Asthma-Schulung empfohlen wurde.

Von **4.785** haben **2.785** Patienten (entspricht **58,2 %**) eine empfohlene Asthma-Schulung im 1. Berichtshalbjahr wahrgenommen. Dieses Qualitätsziel wurde somit nicht erreicht.

Hinweis: Es werden nur Patienten mit mindestens vier Quartalen Teilnahmedauer am DMP berücksichtigt.

4.3.6.2 DMP COPD

Das Qualitätsziel: Teilnahme von mindestens **85 %** der Patienten an der empfohlenen COPD-Schulung innerhalb von 4 Quartalen nach der Verordnung.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit Empfehlung einer COPD-Schulung.

Von **2.567** haben **1.634** Patienten (entspricht **63,7 %**) die empfohlene COPD-Schulung im 1. Berichtshalbjahr wahrgenommen. Dieses Qualitätsziel wurde nicht erreicht.

4.3.7 SELBSTMANAGEMENT (DMP ASTHMA BRONCHIALE)

Bei den chronischen obstruktiven Atemwegserkrankungen vermag die Patientin oder der Patient durch Selbstmanagement und über eine Verhaltensänderung bei lebensstilassoziierten Risikofaktoren den Krankheitsverlauf erheblich zu beeinflussen.

Das Qualitätsziel: Mindestens **90 %** der Patienten setzen einen schriftlichen Selbstmanagementplan ein.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation.

Dieses Ziel wurde verfehlt, da nur **80,7 %** der Patienten (entspricht **13.845** von **17.158** Patienten) einen Selbstmanagementplan einsetzten.

4.3.8 RAUCHER (DMP COPD)

Im Rahmen der Therapie klärt die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt die Patientinnen und Patienten über die besonderen Risiken des Rauchens und des Passivrauchens bei Asthma bronchiale auf, verbunden mit spezifischen Beratungsstrategien und der dringenden Empfehlung, das Rauchen aufzugeben.

Das Qualitätsziel: Einen niedrigen Anteil, der zum Zeitpunkt der Einschreibung, rauchenden Patienten, weiterhin rauchen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, die bei der Erstdokumentation Raucher waren und für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegen.

Von **5.036** eingeschriebenen Patienten haben **3.529** Patienten (**70,1%**) im 1. Berichtshalbjahr geraucht.

4.3.9 EXAZERBATIONEN (DMP COPD)

Exazerbationen sind ernst zu nehmende Ereignisse, die von vielen COPD-Patienten als bedrohlich erlebt werden. Bei schweren Formen kann es sein, dass Sie ins Krankenhaus müssen. COPD-Exazerbationen entstehen oft im Zusammenhang mit Erkältungen oder anderen Infekten der Atemwege.

Das Qualitätsziel: Höchstens **20 %** der Patienten hatten eine oder mehr Exazerbationen innerhalb der letzten sechs Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle eingeschriebenen Patienten mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Das Ziel wurde sehr gut erreicht. Im 1. Berichtshalbjahr hatten **10,8 %** der Patienten (**1.301** von **12.041** Patienten) eine oder mehr Exazerbationen.

4.3.10 ÜBERWEISUNG ZUM FACHARZT (DMP COPD)

Dieses Qualitätsziel wurde im 1. Berichtshalbjahr nicht im Feedbackbericht aufgeführt.

4.3.11 ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend wird dargestellt, in welchen Fällen die Qualitätsziele erreicht (✓) oder nicht erreicht (✗) worden sind, bezogen auf die DMPs Asthma bronchiale und COPD. Zu den Qualitätszielen Symptomkontrolle, Asthma-Schulung und Raucher kann keine abschließende Beurteilung erfolgen.

	Asthma bronchiale	COPD
Notfallmäßige stationäre Behandlung	✓	✓
Überprüfung der Inhalationstechnik	✓	✗
Glukokortikosteroide	✓	✓
Schulungen	✗	✗
Selbstmanagement (DMP Asthma bronchiale)	✗	-
Exazerbationen (DMP COPD)	-	✓

4.4 ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 2. BERICHTSHALBJAHR

4.4.1 NOTFALLMÄßIGE STATIONÄRE BEHANDLUNG

4.4.1.1 DMP ASTHMA BRONCHIALE

Das Qualitätsziel: Höchstens **10 %** der Patienten hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen Asthma bronchiale innerhalb der letzten sechs Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Im 2. Berichtshalbjahr wurden lediglich **106** von **18.215** Patienten (entspricht **0,6 %**) notfallmäßig behandelt.

Damit wurde das Ziel - wie bereits in den Vorjahren auch - klar erreicht.

4.4.1.2 DMP COPD

Das Qualitätsziel: Höchstens **40 %** der Patienten hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen COPD innerhalb der letzten sechs Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Im 2. Berichtshalbjahr wurden **262** von **11.464** Patienten (entspricht **2,3 %**) notfallmäßig behandelt.

Damit wurde das Ziel erreicht.

4.4.2 ÜBERPRÜFUNG DER INHALATIONSTECHNIK

4.3.10.1 DMP ASTHMA BRONCHIALE

Das Qualitätsziel: Bei mindestens **90 %** der Patienten wird die Inhalationstechnik im Berichtszeitraum überprüft.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit inhalativer Medikation.

Bei **22.933** von **24.795** Patienten (entspricht **92,5 %**), die eine inhalative Medikation erhalten, wurde die Inhalationstechnik überprüft.

Das Qualitätsziel wurde somit erreicht.

4.3.10.2 DMP COPD

Das Qualitätsziel: Bei mindestens **90 %** der Patienten wird die Inhalationstechnik im Berichtszeitraum überprüft.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Bei **11.923** von **14.087** Patienten (entspricht **84,6 %**), die eine inhalative Medikation erhalten, wurde die Inhalationstechnik überprüft.

Das Qualitätsziel wurde verfehlt.

4.4.3 INHALATIVE GLUKOKORTIKOSTEROIDE

4.4.3.2 DMP ASTHMA BRONCHIALE

Das Qualitätsziel: Mindestens **90 %** der Patienten werden inhalative Glukokortikosteroide als Bestandteil einer Dauermedikation verordnet.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit Verordnung einer Dauermedikation ohne Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide.

Im 2. Berichtshalbjahr erhielten **20.333** von **21.457** (entspricht **94,8 %**) aller eingeschriebenen Patienten systemische Glukokortikosteroide.

Das Qualitätsziel wurde somit sehr gut erreicht.

4.4.3.3 DMP COPD

Das Qualitätsziel: Höchstens **10 %** der Patienten werden über zwei oder mehr aufeinander folgende Dokumentationen systemische Glukokortikosteroide verordnet.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Im 2. Berichtshalbjahr erhielten **530** von **14.087** (entspricht **3,8 %**) aller eingeschriebenen Patienten systemische Glukokortikosteroide.

Das Qualitätsziel wurde somit sehr gut erreicht.

4.4.4 SYMPTOMKONTROLLE (DMP ASTHMA BRONCHIALE)

Das Qualitätsziel: Hoher Anteil von Patienten mit guter Symptomkontrolle.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation.

90,1 % (14.731 von 16.342 Patienten) wiesen im 2. Berichtshalbjahr eine gute Symptomkontrolle auf.

Hinweis: Da dieses Qualitätsziel auf Ausprägungen des Dokumentationsparameters „Häufigkeit von Asthma-Symptomen“ in der Dokumentationsversion 3.x beruht, werden Dokumentationen der Vorversionen nicht berücksichtigt.

4.4.5 ASTHMA-SCHULUNG (QUOTE - DMP ASTHMA BRONCHIALE)

Das Qualitätsziel: Hoher Anteil von Patienten, die im Rahmen des DMP eine Asthma-Schulung erhalten haben.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Im 2. Berichtshalbjahr haben **8.209** von **25.809** Patienten (entspricht **31,8 %**) eine Asthma-Schulung im Rahmen des DMP erhalten.

4.4.6 SCHULUNGEN

4.4.6.1 DMP ASTHMA BRONCHIALE

Das Qualitätsziel: Mindestens **85 %** der Patienten haben eine empfohlene Asthma-Schulung wahrgenommen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, denen vier Quartale vor dem Berichtszeitraum eine Asthma-Schulung empfohlen wurde.

Im 2. Berichtshalbjahr haben **2.792** von **5.078** Patienten (entspricht **55 %**) eine empfohlene Asthma-Schulung wahrgenommen. Dieses Qualitätsziel wurde nicht erreicht.

Hinweis: Es werden nur Patienten mit mindestens vier Quartalen Teilnahmedauer am DMP berücksichtigt.

4.4.6.2 DMP COPD

Das Qualitätsziel: Teilnahme von mindestens **85 %** der Patienten an der empfohlenen COPD-Schulung innerhalb von 4 Quartalen nach der Verordnung.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit Empfehlung einer COPD-Schulung.

Im 2. Berichtshalbjahr haben **1.659** von **2.682** Patienten an der empfohlenen COPD-Schulung teilgenommen. Das Ziel wurde mit **61,9 %** ebenfalls nicht erreicht

4.4.7 SELBSTMANAGEMENTPLAN (DMP ASTHMA BRONCHIALE)

Das Qualitätsziel: Mindestens **90 %** der Patienten setzen einen schriftlichen Selbstmanagementplan ein.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation.

Im 2. Berichtshalbjahr haben **80,4 % (13.131 von 16.342 Patienten)** einen schriftlichen Selbstmanagementplan eingesetzt.

Das Qualitätsziel wurde nicht erreicht.

4.4.8 RAUCHER (DMP COPD)

Das Qualitätsziel: Niedriger Anteil an rauchenden Patienten.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Von **14.087** Patienten haben **5.679 (40,3 %)** im 2. Berichtshalbjahr geraucht.

4.4.9 EXAZERBATIONEN (DMP COPD)

Das Qualitätsziel: Höchstens **50 %** der Patienten hatten zwei oder mehr Exazerbationen bei Betrachtung der letzten sechs Monate des DMP.

Grundgesamtheit: Alle Patienten mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Im 2. Berichtshalbjahr hatten **447** der **11.464** Patienten (entspricht **3,9 %**) zwei oder mehr Exazerbationen innerhalb der letzten sechs Monate.

Das Qualitätsziel wurde damit erreicht.

4.4.10 ÜBERWEISUNG ZUM FACHARZT (DMP COPD)

Das Qualitätsziel: Mindestens **90 %** der Patienten werden bei Beginn der Dauertherapie mit systemischen Glukokortikosteroiden in der vorhergehenden Dokumentation zum Facharzt überwiesen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit Beginn der Verordnung systemischer Glukokortikosteroide in der vorhergehenden Dokumentation und in der aktuellen Dokumentation.

Im 2. Berichtshalbjahr wurden **17** von **104** Patienten (entspricht **16,3 %**), die mit einer Dauertherapie mit systemischen Glukokortikosteroiden begonnen haben, zum Facharzt überwiesen.

Das Qualitätsziel wurde nicht erreicht.

4.4.11 ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend wird dargestellt, in welchen Fällen die Qualitätsziele erreicht (✓) oder nicht erreicht (✗) worden sind, bezogen auf die DMPS Asthma bronchiale und COPD. Zu den Qualitätszielen Symptomkontrolle, Asthma-Schulung und Raucher kann keine abschließende Beurteilung erfolgen.

	Asthma bronchiale	COPD
Notfallmäßige stationäre Behandlung	✓	✓
Überprüfung der Inhalationstechnik	✓	✗
Glukokortikosteroide	✓	✓
Schulungen	✗	✗
Selbstmanagement (DMP Asthma bronchiale)	✗	-
Exazerbationen (DMP COPD)	-	✓
ÜBERWEISUNG ZUM FACHARZT (DMP COPD)	-	✗

5 BRUSTKREBS

Brustkrebs oder Mammakarzinom ist der häufigste bösartige Tumor der Brustdrüse des Menschen. Er kommt hauptsächlich bei Frauen vor; nur etwa jede hundertste dieser Krebserkrankungen tritt bei Männern auf. Die meisten Erkrankungen treten sporadisch (zufällig) auf, es gibt aber sowohl erbliche als auch erworbene Risikofaktoren. Neben der Heilung sind der Erhalt der betreffenden Brust und vor allem der Lebensqualität erklärtes Ziel der medizinischen Behandlung.

Die Therapie besteht in der Regel in einer an das Erkrankungsstadium angepassten Kombination aus Operation sowie Zytostatika-, Hormon- und Strahlentherapie.

5.1 ZIELE IM DMP BRUSTKREBS

In Ergänzung des aktuellen Versorgungsangebotes wird im Rahmen eines strukturierten Behandlungsprogramms eine interdisziplinäre, berufs- und sektorenübergreifende Behandlung in einer integrierten Versorgungsform mit dem notwendigen logistischen Hintergrund gewährleistet.

Den an Brustkrebs erkrankten Frauen wird besonders durch individuelle Beratung und Informationen durch die Vertragspartner die Möglichkeit gegeben, stärker aktiv am Behandlungs- und somit auch Genesungsprozess mitzuwirken. Folgende Ziele haben die Vertragspartner vereinbart:

primär

- Verbesserung der Versorgungsqualität beim Mammakarzinom auf der Basis jeweils besten, verfügbaren evidenzbasierten Standards
- Steigerung der Lebensqualität der Patientinnen
- Erhöhung der Dauer eines rezidivfreien Überlebens
- Verringerung der brustkrebsbedingten Mortalität (langfristig gemessen)

sekundär in der adjuvanten Situation

- Erhöhung des Anteils brusterhaltender Therapie (BET) mit Strahlentherapie am Anteil aller (Erst-) Operationen
- Senkung des Anteils von Lokalrezidiven bei BET in Bezug zur Anzahl der Lokalrezidive
- Ausreichende Entfernung von Lymphknoten bei invasivem Tumortyp
- Optimierung der medikamentösen Therapie

sekundär in der metastasierten Situation

- Verlängerung des progressionsfreien Überlebens
- Verbesserung der Lebensqualität der Patientinnen

Die Teilnahme als DMP-verantwortlicher Vertragsarzt beim DMP Brustkrebs können folgende Arztgruppen erklären:

- Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunktbezeichnung Hämatologie und Internistische Onkologie oder mit Genehmigung zur Teilnahme an der Onkologie-Vereinbarung als onkologisch verantwortlicher Arzt

Der Nachweis einer Fortbildung „Brustkrebs“ und mindestens halbjährliche Teilnahme an einer interdisziplinären, sektorenübergreifenden Fortbildungsveranstaltung, die von der Ärztekammer anerkannt wird und Teilnahme an einem von der KV Hamburg anerkannten Qualitätszirkel oder einer prä- und postoperativen Behandlungsplanung (Fallkonferenz an einem anerkannten Brustzentrum) sind Voraussetzungen zur Teilnahme am DMP.

Der DMP-verantwortliche Arzt informiert die Patientin über qualitätsgesicherte Behandlungsmaßnahmen und einzelfallbezogen in Betracht kommende Behandlungsalternativen sowie über das für sie individuell sinnvolle Nachsorgekonzept inklusive geeigneter Rehabilitationsmaßnahmen, psychosozialer Angebote und ggf. besondere Angebote der Krankenkasse.

5.2 DATEN ZU DEN TEILNEHMENDEN LEISTUNGSERBRINGERN UND DEN TEILNEHMENDEN PATIENTINNEN

5.2.1 DATEN ZU TEILNEHMENDEN LEISTUNGSERBRINGERN

Im ambulanten Sektor nahmen im Bereich der KV Hamburg **60** Gynäkologen, davon **21** onkologisch qualifizierte koordinierende Ärzte, als DMP-verantwortliche Vertragsärzte bis zum 31. Dezember 2018 teil.

Bei der jährlichen Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen hat ein Gynäkologe die erforderlichen Nachweise nicht erbracht.

Im Rahmen des stationären Sektors, sind **sechs** Brustzentren in den Vertrag eingebunden.

Die medizinischen Inhalte für das DMP Brustkrebs werden in der DMP-Richtlinie des G-BA festgelegt. Aus den Anlagen 1, 2 und 3 des DMP-Vertrages ergeben sich die Anforderungen und Pflichten für die teilnehmenden Einrichtungen und Ärzte.

Die Krankenkassen/-verbände in Hamburg haben mit den Brustzentren zweiseitige gleichlautende Verträge nach § 140b SGB V und mit der KV Hamburg nach § 83 SGB V abgeschlossen.

Es können nur Brustzentren am DMP teilnehmen, die eine Zertifizierung (nach OnkoZert oder EUSOMA) als Nachweis der Erfüllung der Strukturvoraussetzungen vorweisen. In begründeten Ausnahmefällen können Kooperationen mit niedergelassenen Vertragsärzten in den Fachgebieten Radiologie, Strahlentherapie, Pathologie und Hämatologie/Onkologie erfolgen. Für das Personal, Pflegepersonal und medizinisches Assistenzpersonal ist mindestens zweimal jährlich die Teilnahme an Fortbildungen zum Thema


Brustkrebs erforderlich. Interdisziplinäre Fallbesprechungen müssen mindestens einmal wöchentlich stattfinden. Es sollten den Patientinnen assoziierte Leistungen durch Psychologen, Psychiater, Schmerzspezialisten und Physiotherapeuten angeboten werden können sowie eine Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen. Aufgaben und Pflichten des anerkannten Brustzentrums sind die Beachtung der in der DMP-Richtlinie des G-BA geregelten Versorgungsinhalte.

Die Erfüllung der Strukturvoraussetzung der Brustzentren und deren Kooperationspartner ist einmal jährlich der GE nachzuweisen.

5.2.2 DATEN ZU TEILNEHMENDEN PATIENTINNEN

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 sind **481** Patientinnen in das DMP Brustkrebs eingeschrieben.

Die teilnehmenden Patientinnen aller Praxen sind durchschnittlich **64** Jahre alt. Wie sich die Altersstruktur der Patientinnen verteilt, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:



5.2.3 DATEN ZU DEN ÜBERMITTELTEN DOKUMENTATIONEN

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2018 liegen für das **DMP Brustkrebs** **506** Patienten Dokumentationen vor. Davon **48** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **458** Patienten mit mindestens einer

Seite **38** von **89**

Folgedokumentation. Im Berichtszeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2018 liegen für **457** Patienten Dokumentationen vor. Alle diese Patienten wurden im Kernbericht berücksichtigt. Davon **62** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **395** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation.

5.3 ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 1. BERICHTSHALBJAHR

Die Versorgung von Patientinnen mit Brustkrebs findet in Hamburg auf einem äußerst hohen Niveau statt. Dieses wird im vorliegenden Qualitätsbericht nicht abgebildet, da sich nur eine geringe Zahl der Patientinnen für eine Teilnahme am DMP Brustkrebs entscheiden. Die daraus resultierenden geringen Grundgesamtheiten führen bei den einzelnen Qualitätszielen zu Ergebnissen, die nicht repräsentativ für das Hamburger Versorgungsniveau sind.

5.3.1 BRUSTERHALTENDE THERAPIE (BET)

Neben der Tumorgroße sind bei der Entscheidung, ob eine brusterhaltende Therapie in Frage kommt, insbesondere die Tumorausdehnung, die Relation der Tumorgroße zum Restbrustvolumen und der Wunsch der aufgeklärten Patientin zu berücksichtigen.

Das Qualitätsziel: Mindestens **70 %** der Patientinnen mit brusterhaltender Therapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen im Stadium pT1 mit Operation.

Bei **180** von **214** Patientinnen (entspricht **84,1 %**) wurde eine brusterhaltende Therapie durchgeführt. Das Qualitätsziel wurde somit übertroffen.

5.3.2 SENTINEL-LYMPHKNOTEN-BIOPSIE

Unter der Sentinel-Lymphknotenbiopsie (SNLB) versteht man eine Form der Lymphknotenbiopsie, bei der der Wächterlymphknoten (Sentinel-Lymphknoten) eines malignen Tumors zur anschließenden histologischen Untersuchung entfernt wird.

Das Qualitätsziel: Angemessener Anteil von Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten Biopsie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit Operation und Erhebung des Nodalstatus bei invasivem Tumor.

Bei **155** von **186** Patientinnen (entspricht **83,3 %**) wurde eine Sentinel-Lymphknoten-Biopsie durchgeführt.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen berücksichtigt, die keine präoperative/neoadjuvante Therapie erhielten. Da dieses Merkmal erst ab der Dokumentationsversion 3.x erhoben wird, werden Dokumentationen der Vorversionen nicht berücksichtigt.

5.3.3 NACHBESTRAHLUNG

Eine Strahlentherapie kann auch eine andere Krebsbehandlung unterstützen. Ein Beispiel ist die Nachbestrahlung nach einer Operation: Die Strahlung soll möglicherweise im Körper zurückgebliebene einzelne Tumorzellen zerstören. Eine solche "adjuvante" oder begleitende Bestrahlung kann Patienten vor einem Rückfall schützen.

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patientinnen mit regulär abgeschlossener Bestrahlung nach brusterhaltender Therapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit brusterhaltender Therapie bei invasivem Tumor.

Es erhielten **95,6 % (219 von 229 Patientinnen)** der Patientinnen nach brusterhaltender Therapie eine Nachbestrahlung.

Das Qualitätsziel wurde damit deutlich übertroffen.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen mit dem Status „postoperativ“ berücksichtigt, für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt.

5.3.4 HER2/NEU – BESTIMMUNG

Patientinnen werden als HER2-positiv bezeichnet, wenn auf ihrem Brustkrebsgewebe sehr hohe Mengen von HER2 nachgewiesen wurden (IHC 3+ oder IHC 2+ ISH+ oder ISH+). Von HER2-positiven Patientinnen weiß man, dass sie im Vergleich an einer aggressiveren Form von Brustkrebs leiden und deshalb eine ungünstige Prognose haben. Laut Literatur sind etwa **20 %** der Patientinnen mit Brustkrebs HER2-positiv. HER2-positiv bedeutet aber auch, dass diese Patientinnen von einer zielgerichteten und effektiven Therapie gegen diese Zellen profitieren können

Das Qualitätsziel: Mindestens **95 %** der Patientinnen mit Bestimmung des HER2/neu-Status.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen.

Bei **270** von **287** Patientinnen (entspricht **94,1 %**) wurde der HER2/neu-Status bestimmt. Das Qualitätsziel wurde damit knapp verfehlt.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen mit dem Status „postoperativ“ berücksichtigt. Da dieses Merkmal erst ab der Dokumentationsversion 3.x erhoben wird, werden Dokumentationen der Vorversion nicht berücksichtigt.

5.3.5 ADJUVANTE ENDOKRINE THERAPIE

Für alle Patientinnen muss nach individueller Nutzen-Risikoabwägung die Einleitung einer adjuvanten systemischen Therapie geprüft werden. Die Entscheidung über die Empfehlung einer adjuvanten Therapie richtet sich nach den individuell vorliegenden prognostischen und prädiktiven Faktoren. Dazu gehören insbesondere das Grading und ggf. weitere tumorspezifische Kriterien z. B. Proliferationsfaktoren, die in ihrer Bedeutung als prognostische Marker international kontrovers diskutiert werden, der Hormonrezeptorstatus, der HER2-Status, die Tumorgroße, 6 Anlage 3 zum DMP-Vertrag Brustkrebs in der Fassung vom 01.10.2018 der Lymphknotenstatus, und der Menopausenstatus. Alter und Komorbidität sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patientinnen mit andauernder oder regulär abgeschlossener adjuvanter endokriner Therapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit hormonrezeptor-positivem invasivem Tumor.

Es erhielten **85,5 % (230 von 269 Patientinnen)** der Patientinnen eine adjuvante endokrine Therapie. Das Qualitätsziel wurde somit erreicht.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen mit dem Status „postoperativ“ berücksichtigt, für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt.

5.3.6 ADJUVANTE TRASTUZUMAB-THERAPIE

Eine viel versprechende Option bietet der humanisierte monoklonale Antikörper Trastuzumab. Trastuzumab ist gegen den membranständigen Oberflächenrezeptor HER2/neu gerichtet, der bei etwa **20 bis 25 %** aller Mammakarzinompatientinnen überexprimiert ist.

Das Qualitätsziel: Angemessener Anteil von Patientinnen mit andauernder oder regulär abgeschlossener Trastuzumab-Therapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit HER2/neu-positivem invasivem Tumor und Lymphknotenbefall.

Es haben **60,0 % (6 von 10 Patientinnen)** der Patientinnen eine Trastuzumab-Therapie erhalten.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen mit dem Status „postoperativ“ berücksichtigt, für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt. Da dieses Merkmal erst ab der Dokumentationsversion 3.x erhoben wird, werden Dokumentationen der Vorversion nicht berücksichtigt.

5.3.7 ADJUVANTE CHEMOTHERAPIE

Die adjuvante Chemotherapie ist eine unterstützende Behandlungsmaßnahme, um die Rückfallrate zu verringern und damit die Chancen auf eine Heilung weiter zu erhöhen. Voraussetzung ist immer eine erfolgreiche Operation, in der zuvor der Tumor vollständig entfernt werden konnte.

Die adjuvante Chemotherapie soll Krebszellen abtöten, die nach der Operation eventuell noch im Körper vorhanden sind und später Rückfälle verursachen könnten.

Das Qualitätsziel: Angemessener Anteil von Patientinnen mit andauernder oder regulär abgeschlossener adjuvanter Chemotherapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit hormonrezeptor-negativem invasivem Tumor und Lymphknotenbefall.

Es haben **90,9 % (10 von 11 Patientinnen)** der Patientinnen eine adjuvante Chemotherapie erhalten.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen mit dem Status „postoperativ“ berücksichtigt, für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt.

5.3.8 BISPHOSPHONAT-THERAPIE

Bisphosphonate sind Medikamente, die in den Knochenstoffwechsel eingreifen. Für Brustkrebspatientinnen sind sie wichtig, wenn die Hormonentzugsbehandlung zu einer verminderten Knochenstabilität führen könnte oder sich schon eine sogenannte Osteoporose entwickelt hat.

Das Qualitätsziel: Angemessener Anteil von Patientinnen mit Bisphosphonat-Therapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle Patientinnen mit Knochenmetastasen ohne Kontraindikation gegen Bisphosphonat.

Es haben **83,3 % (10 von 12 Patientinnen)** der Patientinnen eine Bisphosphonat-Therapie erhalten.

5.3.9 LYMPHÖDEM

Das Lymphödem ist eine sicht- und tastbare Flüssigkeitsansammlung im Interstitium (Zwischenzellraum). Es wird durch mechanische Insuffizienz des Lymphgefäßsystems hervorgerufen, so dass die interstitielle Flüssigkeit nicht mehr ausreichend über die Lymphgefäße abtransportiert werden kann. Dies führt zu einem Rückstau und zur Ansammlung von Flüssigkeit in den Zellzwischenräumen (Ödem). Neben den Extremitäten können auch das Gesicht, der Hals, der Rumpf und die Genitalien betroffen sein. Beim Lymphödem handelt sich um eine Symptombeschreibung, nicht um eine Diagnose.

Das Qualitätsziel: Niedriger Anteil von Patientinnen mit Lymphödem.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit invasivem Tumor und Operation.

Es haben **4,3 % (15 von 346 Patientinnen)** der Patientinnen ein Lymphödem bekommen.

5.3.10ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend wird dargestellt, in welchen Fällen die Qualitätsziele erreicht (✓) oder nicht erreicht (✗) worden sind, bezogen auf das DMP Brustkrebs. Zu den Qualitätszielen Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, Adjuvante Trastuzumab-Therapie, Adjuvante Chemotherapie, Bisphosphonat-Therapie, Lymphödem kann keine abschließende Beurteilung erfolgen.

	Brustkrebs
Brusterhaltende Therapie (BET)	✓
Nachbestrahlung	✓
HER2/NEU – BESTIMMUNG	✗
ADJUVANTE ENDOKRINE THERAPIE	✓

5.4 ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 2. BERICHTSHALBJAHR

5.4.1 BRUSTERHALTENDE THERAPIE (BET)

Das Qualitätsziel: Mindestens **70 %** der Patientinnen mit brusterhaltender Therapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen im Stadium pT1 mit Operation.

Bei **196 von 227 Patientinnen (entspricht 86,3 %)** wurde eine brusterhaltende Therapie durchgeführt. Das Qualitätsziel wurde somit übertroffen.

5.4.2 SENTINEL-LYMPHKNOTEN-BIOPSIE

Das Qualitätsziel: Angemessener Anteil von Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten Biopsie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit Operation und Erhebung des Nodalstatus bei invasivem Tumor.

Bei **176** von **211** Patientinnen (entspricht **83,4 %**) wurde eine Sentinel-Lymphknoten-Biopsie durchgeführt.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen berücksichtigt, die keine präoperative/neoadjuvante Therapie erhielten. Da dieses Merkmal erst ab der Dokumentationsversion 3.x erhoben wird, werden Dokumentationen der Vorversionen nicht berücksichtigt.

5.4.3 NACHBESTRAHLUNG

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patientinnen mit regulär abgeschlossener Bestrahlung nach brusterhaltender Therapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit brusterhaltender Therapie bei invasivem Tumor.

Es erhielten **96,4 % (242 von 251 Patientinnen)** der Patientinnen nach brusterhaltender Therapie eine Nachbestrahlung.

Das Qualitätsziel wurde damit deutlich übertroffen.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen mit dem Status „postoperativ“ berücksichtigt, für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt.

5.4.4 HER2/NEU – BESTIMMUNG

Das Qualitätsziel: Mindestens **95 %** der Patientinnen mit Bestimmung des HER2/neu-Status.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen.

Bei **284** von **307** Patientinnen (entspricht **92,5 %**) wurde der HER2/neu-Status bestimmt. Das Qualitätsziel wurde damit knapp verfehlt.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen mit dem Status „postoperativ“ berücksichtigt. Da dieses Merkmal erst ab der Dokumentationsversion 3.x erhoben wird, werden Dokumentationen der Vorversion nicht berücksichtigt.

5.4.5 ADJUVANTE ENDOKRINE THERAPIE

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patientinnen mit andauernder oder regulär abgeschlossener adjuvanter endokriner Therapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit hormonrezeptor-positivem invasivem Tumor.

Es erhielten **84,3 % (241 von 286 Patientinnen)** der Patientinnen eine adjuvante endokrine Therapie. Das Qualitätsziel wurde somit erreicht.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen mit dem Status „postoperativ“ berücksichtigt, für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt.

5.4.6 ADJUVANTE TRASTUZUMAB-THERAPIE

Das Qualitätsziel: Angemessener Anteil von Patientinnen mit andauernder oder regulär abgeschlossener Trastuzumab-Therapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit Her2/neu-positivem invasivem Tumor und Lymphknotenbefall.

Es haben **71,4 % (10 von 14 Patientinnen)** der Patientinnen eine Trastuzumab-Therapie erhalten.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen mit dem Status „postoperativ“ berücksichtigt, für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt. Da dieses Merkmal erst ab der Dokumentationsversion 3.x erhoben wird, werden Dokumentationen der Vorversion nicht berücksichtigt.

5.4.7 ADJUVANTE CHEMOTHERAPIE

Das Qualitätsziel: Angemessener Anteil von Patientinnen mit andauernder oder regulär abgeschlossener adjuvanter Chemotherapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit hormonrezeptor-negativem invasivem Tumor und Lymphknotenbefall.

Es haben **100 % (10 von 10 Patientinnen)** der Patientinnen eine adjuvante Chemotherapie erhalten.

Hinweis: Es werden nur Patientinnen mit dem Status „postoperativ“ berücksichtigt, für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt.

5.4.8 BIPHOSPHONAT-THERAPIE

Das Qualitätsziel: Angemessener Anteil von Patientinnen mit Bisphosphonat-Therapie.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle Patientinnen mit Knochenmetastasen ohne Kontraindikation gegen Bisphosphonat.

Es haben **87,5 % (7 von 8 Patientinnen)** der Patientinnen eine Bisphosphonat-Therapie erhalten.

5.4.9 LYMPHÖDEM

Das Qualitätsziel: Niedriger Anteil von Patientinnen mit Lymphödem.

Berücksichtigte Patientinnen: Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit invasivem Tumor und Operation.

Es haben **5,2 % (19 von 364 Patientinnen)** der Patientinnen ein Lymphödem bekommen.

5.4.10ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend wird dargestellt, in welchen Fällen die Qualitätsziele erreicht (✓) oder nicht erreicht (✗) worden sind, bezogen auf das DMP Brustkrebs. Zu den Qualitätszielen Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, Adjuvante Trastuzumab-Therapie, Adjuvante Chemotherapie, Bisphosphonat-Therapie, Lymphödem kann keine abschließende Beurteilung erfolgen.

Brustkrebs	
Brusterhaltende Therapie (BET)	✓
Nachbestrahlung	✓
HER2/NEU – BESTIMMUNG	✗
ADJUVANTE ENDOKRINE THERAPIE	✓

5.5 TUMORSTADIEN

Frauen mit einer Tumorgroße ≥ 2 cm gehören zur Patientinnengruppe mit erhöhtem Risiko. Abhängig von der Tumorgroße unterscheiden sich die therapeutischen Maßnahmen. Die **untenstehende Tabelle** zeigt die Anteile und die Anzahl der eingeschriebenen Patientinnen differenziert nach Tumorstadien (pTN) zum Zeitpunkt der Einschreibung, bezogen auf alle eingeschriebenen Patientinnen seit Beginn des DMP mit Angaben zu pT und pN.

seit dem DMP-Beginn					
	pNX	pN0	pN1	pN2	pN3
pTX	38 0,6%	14 0,2%	7 0,1%	6 0,1%	3 0,0%
pTis	116 1,7%	224 3,3%	8 0,1%	3 0,0%	0 0,0%
pT0	0 0,0%	41 0,6%	3 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
pT1	83 1,2%	2.897 42,2%	715 10,4%	96 1,4%	32 0,5%
pT2	22 0,3%	1.158 16,8%	692 10,1%	183 2,7%	91 1,3%
pT3	1 0,0%	61 0,9%	94 1,4%	76 1,1%	59 0,9%
pT4	12 0,2%	28 0,4%	51 0,7%	31 0,5%	28 0,4%

Tumorgröße (T = Tumor)		Lymphknotenmetastasen (N = Nodes)		
pTX	Tumorgröße nicht bestimmbar	Keine	Aussagen	über
pTis	Carzinoma in situ	Keine	Anzeichen	für
pT0	kein Anhalt für Primärtumor	Zunehmender lymphknotenbefall abhängig von der Lokalisation des Primärtumors; Einteilung z. B. nach ipsi- oder kontralateralem Befall und Beweglichkeit, sowie Lokalisation in Relation zum Primärtumor		
pT1	≤ 2 cm			
pT2	2 cm bis ≤ 5 cm			
pT3	≥ 5 cm			
pT4	Tumor jeder Größe mit direkter Ausdehnung auf Brustwand oder Haut			

6 DIABETES MELLITUS TYP 1

Schätzungsweise **300.000 bis 600.000** Kinder und Erwachsene sind vom Diabetes mellitus Typ 1 betroffen. Eine Zunahme der Erkrankungshäufigkeit ist zu erwarten. Da der Erkrankungsbeginn häufig im Kindes- und Jugendalter liegt, ist der Behandlung von Kindern und Jugendlichen ein besonderer Schwerpunkt zu widmen. Im Gegensatz zum Diabetes mellitus Typ 2 ist der Diabetes mellitus Typ 1 nur durch die lebensnotwendige Gabe von Insulin zu behandeln. Hierdurch wird den Betroffenen eine normale körperlich-geistige, soziale und berufliche Entwicklung ermöglicht. Durch Einhaltung des heutigen Therapiestandards mittels multipler Insulininjektionen oder Insulinpumpen werden das Auftreten und die Progression von diabetischen Folgekomplikationen verhindert. Die Prognose der Patienten verbessert sich erheblich und eine flexible Lebensführung wird ermöglicht.

6.1 ZIELE IM DMP DIABETES MELLITUS TYP 1

Die Versorgung von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 ist in der Region Hamburg aufgrund der sehr guten Versorgungsstrukturen auf einem guten Niveau. Die regelmäßige Überprüfung der Teilnahmevoraussetzung trägt dazu

bei, die Qualitätsstandards des Standorts Hamburg zu halten und zu verbessern.

Die Ziele und Anforderungen an das DMP Diabetes mellitus Typ 1 sind in der Anlage 7 Ziffer 1.3.1 der RSAV in der bis zum 31.12.2011 geltenden Fassung i.V.m. § 321 SGB V geregelt und wurden vertraglich so vereinbart:

- Vermeidung der mikrovaskulären Folgeschäden (Retinopathie mit schwerer Sehbehinderung oder Erblindung, Niereninsuffizienz mit der Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie)
- Vermeidung von Neuropathien bzw. Linderung von damit verbundenen Symptomen, insbesondere Schmerzen
- Vermeidung des diabetischen Fußsyndroms mit neuro-, angio- und/oder osteoarthropathischen Läsionen und von Amputationen
- Reduktion des erhöhten Risikos für kardiale, zerebrovaskuläre und sonstige makroangiopathische Morbidität und Mortalität
- Vermeidung von Stoffwechselentgleisungen (Ketoazidosen) und Vermeidung von Nebenwirkungen der Therapie (insbesondere schwere oder rezidivierende Hypoglykämien)

Die spezifischen Versorgungsbelange von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 bis zum Alter von 18 Jahren machen es erforderlich, dass diese in den strukturierten Behandlungsprogrammen besondere Berücksichtigung finden. Zusätzlich zu den für Erwachsene vereinbarten Zielen, stehen entsprechend Anlage 7 Ziffer 1.7.1 der RSAV in der bis zum 31.12.2011 geltenden Fassung i.V.m. § 321 SGB V folgende Ziele im Vordergrund:

- Vermeidung akuter Stoffwechselentgleisungen (Ketoazidose, diabetisches Koma, schwere Hypoglykämie)
- Reduktion der Häufigkeit diabetesbedingter Folgeerkrankungen, auch im subklinischen Stadium; dies setzt eine möglichst normnahe Blutglukoseeinstellung sowie die frühzeitige Erkennung und Behandlung von zusätzlichen Risikofaktoren (z. B. Hypertonie, Dyslipidämie, Adipositas, Rauchen) voraus
- altersentsprechende körperliche Entwicklung (Längenwachstum, Gewichtszunahme, Pubertätsbeginn), altersentsprechende geistige und körperliche Leistungsfähigkeit
- möglichst geringe Beeinträchtigung der psychosozialen Entwicklung und der sozialen Integration der Kinder und Jugendlichen durch den Diabetes mellitus und seine Therapie; die Familie soll in den

Behandlungsprozess einbezogen werden, Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Patienten sind altersentsprechend zu stärken

6.2 DATEN ZU DEN TEILNEHMENDEN LEISTUNGSERBRINGERN, DEN TEILNEHMENDEN PATIENTEN UND DEN ÜBERMITTELTEN DOKUMENTATIONEN

6.2.1 DATEN ZU DEN TEILNEHMENDEN LEISTUNGSERBRINGERN


Im ambulanten Sektor nehmen **69** diabetologisch qualifizierte Fachärzte, davon **5** fachärztliche Internisten (mit diabetologischer Qualifikation), **9** diabetologisch qualifizierte Kinderärzte, sowie **5** Hausärzte teil.

Im stationären Bereich sind **5** Krankenhäuser, davon **2** Kinderkrankenhäuser und **2** Rehabilitationsklinik vertraglich eingebunden.

6.2.2 DATEN ZU DEN TEILNEHMENDEN PATIENTEN

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 sind **8.546** Patienten in das DMP Diabetes mellitus Typ 1 eingeschrieben.

Die teilnehmenden Patienten aller Praxen sind durchschnittlich **43** Jahre alt. Wie sich die Altersstruktur der Patienten verteilt, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.



6.2.3 DATEN ZU DEN ÜBERMITTELTEN DOKUMENTATIONEN

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2018 liegen für **8.458** Patienten Dokumentationen vor. Davon **517** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **7.941** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation. Im Berichtszeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2018 liegen für **8.546** Patienten Dokumentationen vor. Davon **690** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **7.856** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation.

6.3 ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 1. BERICHTSHALBJAHR

6.3.1 HYPOGLYKÄMIE

Bei einer ungenügenden Stoffwechseleinstellung können Patienten hohe Behandlungskosten verursachen. Durch eine gute Stoffwechselkontrolle können Dauer und Häufigkeit dieser Behandlungen gemindert werden. Die Vermeidung von schweren Hypoglykämien ist ein wesentliches Therapieziel bei der Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1.

Das Qualitätsziel: Höchstens **15 %** der Patienten hatten eine oder mehrere schwere Hypoglykämien innerhalb der letzten zwölf Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens zwölf Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Von **6.205** Patienten im 1. Berichtshalbjahr wurde bei **136** Patienten eine schwere Hypoglykämie dokumentiert. Mit **2,2 %** wurde das Qualitätsziel sehr gut erreicht.

6.3.2 NOTFALLMÄßIGE STATIONÄRE BEHANDLUNG

Die Vermeidung von notfallmäßigen stationären Behandlungen ist ein wesentliches Therapieziel bei der Behandlung.

Das Qualitätsziel: Höchstens **2 %** der Patienten hatten eine oder mehrere stationäre Behandlungen wegen Diabetes innerhalb der letzten sechs Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Von **7.250** Patienten im 1. Berichtshalbjahr wurden **48** Patienten (entspricht **0,7 %**) notfallmäßig stationär behandelt.

Das Qualitätsziel wurde somit in diesem Berichtshalbjahr übertroffen.

6.3.3 BLUTDRUCK (RR $\leq$ 139/89 MMHG)

Die Blutdruckeinstellung ist ein wesentlicher Parameter bei der individuellen Therapiezielplanung, trägt zur Senkung des Mortalitätsrisikos bei und vermindert somit die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung mikro- und makrovaskulärer Folgekomplikationen.

Das Qualitätsziel: Mindestens **60 %** der Patienten mit bekannter Hypertonie haben einen Blutdruck $\leq$ 139/89 mmHg.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde.

Dieses Ziel wurde im 1. Berichtshalbjahr mit **52,2 % (1.462 von 2.802 Patienten)** erreicht.

6.3.4 HbA_{1c}-WERT

Eine wichtige Rolle bei der Behandlung des Diabetes mellitus hat die Kontrolle des sog. Langzeit-Blutzuckerwertes (HbA_{1c}-Wert). Jeder Prozentpunkt, den dieser näher an einen normoglykämischen Wert herangebracht werden kann, wirkt sich günstig auf den weiteren Krankheitsverlauf aus und mindert das Risiko von Folgeerkrankungen.

Das Qualitätsziel: Höchstens **10 %** der Patienten, haben einen HbA_{1c}-Wert von **> 8,5 % (69 mmol/mol)**

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Im 1. Berichtshalbjahr hatten **2.051 von 8.458 Patienten** (entspricht **24,2 %**) einen HbA_{1c}-Wert von **> 8,5 %**.

Dieses Qualitätsziel wurde somit deutlich verfehlt.

6.3.5 INDIVIDUELLER HbA_{1c}-ZIELWERT

Gemeinsam mit dem Patienten sind individuelle Therapieziele zu vereinbaren. Der HbA_{1c}-Wert ist ein zentraler Parameter für die langfristige Stoffwechselkontrolle und stellt neben dem Blutdruck einen wesentlichen Zielwert im Rahmen der individuellen Therapieplanung dar.

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten hat den individuellen vereinbarten HbA_{1c}-Zielwert erreicht.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Es haben **3.043** von **6.205** Patienten (entspricht **49,0 %**) im 1. Berichtshalbjahr ihren individuell vereinbarten HbA_{1c}-Zielwert erreicht.

6.3.6 ALBUMINAUSSCHIEDUNG

Patienten mit Diabetes mellitus sind hinsichtlich einer Entstehung einer diabetischen Nephropathie und möglichen Konsequenzen einer Nierenersatztherapie sehr stark gefährdet. Hier ist zum Ausschluss einer diabetischen Nephropathie als Nachweis die Albumin-Ausscheidungsrate im Morgenurin maßgeblich.

Das Qualitätsziel: Bei mindestens **90 %** der Patienten wurde die Albumin-Ausscheidungsrate in den letzten 12 Monaten bestimmt.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten ab 11 Jahren mit einer DMP-Teilnahmedauer von mindestens 12 Monaten und ohne bereits bestehende Nephropathie und Nierenersatztherapie.

Es wurde bei **3.978** von **5.486** Patienten (entspricht **72,5 %**) die Albumin-Ausscheidungsrate bestimmt. Somit wurde das Qualitätsziel nicht erreicht.

6.3.7 NIERENFUNKTION

Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 haben im Hinblick auf das Alter und ihrer damit einhergehenden Diabetesdauer ein unterschiedlich hohes Risiko für die Entwicklung einer diabetischen Nephropathie.

Das Qualitätsziel: Bei mindestens **90 %** der Patienten wurde der Epidermal Growth Factor Receptor (eGFR) in den letzten 12 Monaten bestimmt.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten ab 18 Jahren mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Im 1. Berichtshalbjahr wurde der eGFR bei **85,7 %** (**5.310** von **6.197** Patienten) bestimmt. Das Ziel wurde nicht erreicht.

6.3.8 FUßSTATUS

Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1, insbesondere mit peripherer Neuropathie und/oder peripherer arterieller Verschlusskrankheit, sind durch die Entwicklung eines diabetischen Fußsyndroms mit einem erhöhten Amputationsrisiko gefährdet.

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** aller Patienten mit Erhebung des Fußstatus in den letzten 12 Monaten.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten ab 18 Jahre mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Im 1. Berichtshalbjahr wurde bei **74,2 % (4.597 von 6.197 Patienten)** aller berücksichtigten Patienten der Fußstatus erhoben. Das hat zur Folge, dass das Qualitätsziel nicht erreicht wurde.

6.3.9 THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER (TAH)

Alle Patienten mit makroangiopathischen Erkrankungen (z. B. kardio- und zerebrovaskulären Erkrankungen) - unter Beachtung der Kontraindikationen und/oder der Unverträglichkeiten - sollen grundsätzlich Thrombozytenaggregationshemmer (TAH) erhalten. Dies gilt insbesondere für Acetylsalicylsäure.

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten mit Makroangiopathie erhalten einen Thrombozytenaggregationshemmer.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, bei den AVK, KHK, Schlaganfall, Herzinfarkt oder Amputation dokumentiert wurde und bei denen keine Kontraindikation vorliegt und/oder die keine orale Antikoagulation erhalten.

Im 1. Berichtshalbjahr wurde **469 von 711 (entspricht 66,0 %)** Patienten ein TAH verordnet. Somit wurde das Qualitätsziel verfehlt.

6.3.10 SCHULUNGEN

Jeder Patient soll Zugang zu einem strukturierten, evaluierten, zielgruppenspezifischen und publizierten Schulungs- und Behandlungsprogramm erhalten. Patientenschulungen dienen der Befähigung der Patienten zur besseren Bewältigung des Krankheitsverlaufs und zur Befähigung zu informierten Patientenentscheidungen.

6.3.10.1 DIABETES-SCHULUNG (QUOTE)

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten hat im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Im 1. Berichtshalbjahr liegt der Anteil der Patienten, die im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen haben, bei **42,7 % (3.404 von 7.978)**.

6.3.10.2 HYPERTONIE-SCHULUNG (QUOTE)

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten mit bekannter Hypertonie hat im Rahmen des DMP an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit bekannter Hypertonie.

Im 1. Berichtshalbjahr liegt der Anteil der Patienten, die im Rahmen des DMP an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen haben, bei **19,2 % (512 von 2.663)**.

6.3.11. ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend wird dargestellt, in welchen Fällen die Qualitätsziele erreicht (✓) oder nicht erreicht (✗) worden sind, bezogen auf das DMP Diabetes mellitus Typ 1. Zu den Schulungen konnte keine abschließende Aussage getroffen werden.

Diabetes mellitus Typ1	
Hypoglykämie	✓
Notfallmäßige Stationäre Behandlung	✓
Blutdruck (RR ≤ 139/89 MMHG)	✓
HBA1C-WERT	✗
Individueller HBA1C-Zielwert	✓
Albuminausscheidung	✗
Nierenfunktion	✗
Fußstatus	✗
Thrombozytenaggregationshemmer (TAH)	✗

6.4 ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 2. BERICHTSHALBJAHR

6.4.1 HYPOGLYKÄMIE

Das Qualitätsziel: Höchstens **15 %** der Patienten hatten eine oder mehrere schwere Hypoglykämien innerhalb der letzten zwölf Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens zwölf Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Von **6.322** Patienten im 2. Berichtshalbjahr wurde bei **360** Patienten eine schwere Hypoglykämie dokumentiert. Mit **5,7 %** wurde das Qualitätsziel sehr gut erreicht.

6.4.2 NOTFALLMÄßIGE STATIONÄRE BEHANDLUNG

Das Qualitätsziel: Höchstens **2 %** der Patienten hatten eine oder mehrere stationäre Behandlungen wegen Diabetes innerhalb der letzten sechs Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Von **6.820** Patienten wurden **56** Patienten (entspricht **0,8 %**) notfallmäßig stationär behandelt. Das Qualitätsziel wurde somit in diesem Berichtshalbjahr übertroffen.

6.4.3 BLUTDRUCK (RR $\leq$ 139/89 MMHG)

Das Qualitätsziel: Mindestens **60 %** der Patienten mit bekannter Hypertonie haben einen Blutdruck $\leq$ 139/89 mmHg.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde.

Dieses Ziel wurde in diesem Berichtshalbjahr mit **51,4 % (1.383 von 2.692 Patienten)** erreicht.

6.4.4 HbA_{1c}-WERT

Das Qualitätsziel: Höchstens **10 %** der Patienten, haben einen HbA_{1c}-Wert von **> 8,5 % (69 mmol/mol)**

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Im 2. Berichtshalbjahr hatten **2.292** von **8.546** Patienten (entspricht **26,8 %**) einen HbA_{1c}-Wert von **> 8,5 %**. Dieses Qualitätsziel wurde somit deutlich verfehlt.

6.4.5 INDIVIDUELLER HbA_{1c}-ZIELWERT

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten hat den individuellen vereinbarten HbA_{1c}-Zielwert erreicht.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Es haben **2.820** von **6.322** Patienten (entspricht **44,6 %**) im 2. Berichtshalbjahr ihren individuell vereinbarten HbA_{1c}-Zielwert erreicht.

6.4.6 ALBUMINAUSSCHIEDUNG

Das Qualitätsziel: Bei mindestens **90 %** der Patienten wurde die Albumin-Ausscheidungsrate in den letzten 12 Monaten bestimmt.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten ab 11 Jahren mit einer DMP-Teilnahmedauer von mindestens 12 Monaten und ohne bereits bestehende Nephropathie und Nierenersatztherapie.

Es wurde bei **4.170** von **5.578** Patienten (entspricht **74,8 %**) die Albumin-Ausscheidungsrate bestimmt. Somit wurde das Qualitätsziel nicht erreicht.

6.4.7 NIERENFUNKTION

Dieses Qualitätsziel wurde im 2. Berichtshalbjahr nicht im Feedbackbericht aufgeführt.

6.4.8 FUßSTATUS

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** aller Patienten mit Erhebung des Fußstatus in den letzten 12 Monaten.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten ab 18 Jahre mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Im 2. Berichtshalbjahr wurde bei **60,8 % (3.705 von 6.096 Patienten)** aller berücksichtigten Patienten der Fußstatus erhoben. Das hat zur Folge, dass das Qualitätsziel nicht erreicht wurde.

6.4.9 THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER (TAH)

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten mit Makroangiopathie erhalten einen Thrombozytenaggregationshemmer.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, bei den AVK, KHK, Schlaganfall, Herzinfarkt oder Amputation dokumentiert wurde und bei denen keine Kontraindikation vorliegt und/oder die keine orale Antikoagulation erhalten.

Im 2. Berichtshalbjahr wurde **463 von 698** (entspricht **66,3 %**) Patienten ein TAH verordnet. Somit wurde das Qualitätsziel verfehlt.

6.4.10 SCHULUNGEN

6.4.10.1 DIABETES-SCHULUNG (QUOTE)

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten hat im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Im 2. Berichtshalbjahr liegt der Anteil der Patienten, die im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen haben, bei **43,1 % (3.683 von 8.546)**.

6.4.10.2 HYPERTONIE-SCHULUNG (QUOTE)

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten mit bekannter Hypertonie hat im Rahmen des DMP an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit bekannter Hypertonie.

Im 2. Berichtshalbjahr liegt der Anteil der Patienten, die im Rahmen des DMP an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen haben, bei **19,7 % (530 von 2.692)**.

6.4.11 ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend wird dargestellt, in welchen Fällen die Qualitätsziele erreicht (✓) oder nicht erreicht (✗) worden sind, bezogen auf das DMP Diabetes mellitus Typ 1. Zu dem Qualitätsziel Nierenfunktion kann keine abschließende Beurteilung erfolgen. Zu den Schulungen konnte keine abschließende Aussage getroffen werden.

Diabetes mellitus Typ1	
Hypoglykämie	✓
Notfallmäßige Stationäre Behandlung	✓
Blutdruck (RR ≤ 139/89 MMHG)	✓
HBA1C-WERT	✗
Individueller HBA1C-Zielwert	✓
Albuminausscheidung	✗
Nierenfunktion	-
Fußstatus	✗
Thrombozytenaggregationshemmer (TAH)	✗

7 DIABETES MELLITUS TYP 2

7.1 ZIELE IM DMP DIABETES MELLITUS TYP 2

Das Ziel ist eine indikationsgesteuerte und systematische Koordination der Behandlung der Versicherten mit Diabetes mellitus Typ 2, insbesondere im Hinblick auf eine interdisziplinäre Kooperation und Kommunikation aller beteiligten Leistungserbringer und der teilnehmenden Krankenkassen, um die Versorgung der Patienten zu optimieren. Der koordinierende Arzt spielt eine zentrale Rolle beim Zugang des Versicherten in das DMP und bei der Umsetzung des DMP, auch im Hinblick auf die Einbeziehung, insbesondere des diabetologisch qualifizierten Versorgungssektors.

Folgende Ziele werden angestrebt:

- Vermeidung von Symptomen der Erkrankung (z. B. Polyurie, Polydipsie, Abgeschlagenheit) einschließlich der Vermeidung neuropathischer Symptome, Vermeidung von Nebenwirkungen der

Therapie (insbesondere schwere oder rezidivierende Hypoglykämien) sowie schwerer hyperglykämischer Stoffwechselentgleisungen

- Reduktion des erhöhten Risikos für kardiale, zerebrovaskuläre und sonstige makroangiopathische Morbidität und Mortalität
- Vermeidung der mikrovaskulären Folgekomplikationen (insbesondere Retinopathie mit schwerer Sehbehinderung oder Erblindung, Niereninsuffizienz mit der Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie)
- Vermeidung des diabetischen Fußsyndroms mit neuro-, angio- und/oder osteoarthropathischen Läsionen und von Amputationen

7.2 DATEN ZU DEN TEILNEHMENDEN LEISTUNGSERBRINGERN, DEN TEILNEHMENDEN PATIENTEN UND DEN ÜBERMITTELTEN DOKUMENTATIONEN

7.2.1 DATEN ZU DEN TEILNEHMENDEN LEISTUNGSERBRINGERN


Im ambulanten Sektor nahmen im Bereich der KV Hamburg **847** Hausärzte auf der Versorgungsebene 1, bis zum 31. Dezember 2018, teil. Auf der Versorgungsebene 2 haben **55** diabetologisch qualifizierte Fachärzte (davon **50** als koordinierende diabetologisch qualifizierte Fachärzte) teilgenommen.

Bei der jährlichen Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen haben **16** Hausärzte die erforderlichen Nachweise nicht erbracht; **3** Hausärzte haben verzichtet.

Im stationären Sektor sind **3** Krankenhäuser und **eine** Rehabilitationsklinik in den Vertrag eingebunden.

7.2.2 DATEN ZU DEN TEILNEHMENDEN PATIENTEN

Die teilnehmenden Patienten aller Praxen sind durchschnittlich **66** Jahre alt. Wie sich die Altersstruktur der Patienten verteilt, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:



7.2.3 DATEN ZU DEN ÜBERMITTELTEN DOKUMENTATIONEN

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2018 liegen für **73.321** Patienten Dokumentationen vor. Davon **5.365** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **67.956** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation.

Im Berichtszeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2018 liegen für **71.392** Patienten Dokumentationen vor. Davon **5.424** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **65.968** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation.

7.3 ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 1. BERICHTSHALBJAHR

7.3.1 HYPOGLYKÄMIE

Bei einer ungenügenden Einstellung können Patienten überdurchschnittlich hohe Behandlungskosten verursachen. Durch eine gute Stoffwechselkontrolle können Dauer und Häufigkeit dieser Behandlungen gemindert werden. Ein wesentliches Therapieziel ist die Vermeidung von schweren Hypoglykämien bei der Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2.

Das Qualitätsziel: Weniger als **1 %** der Patienten hatten eine oder mehr notfallmäßigen Behandlungen von Hypoglykämien der letzten 12 Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Bei einer Grundgesamtheit von **57.951** im 1. Berichtshalbjahr wurde bei **255** Patienten eine schwere Hypoglykämie dokumentiert.

Mit **0,4 %** wurde das Qualitätsziel im Bereich der KV Hamburg - wie bereits in den Vorjahren - klar erreicht.

7.3.2 NOTFALLMÄßIGE STATIONÄRE BEHANDLUNG

Die Vermeidung von notfallmäßigen stationären Behandlungen ist eines der wesentlichen Therapieziele bei der Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2.

Das Qualitätsziel: Weniger als **1 %** der Patienten hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen Diabetes innerhalb der letzten sechs Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Bei einer Grundgesamtheit von **63.230** im 1. Berichtshalbjahr wurden **108** Patienten (entspricht **0,2 %**) notfallmäßig stationär behandelt. Das Qualitätsziel wurde somit eindeutig erreicht.

7.3.3 METFORMIN

Der Wirkstoff **Metformin** gehört zu den oralen Diabetes-Medikamenten (Antidiabetika) und wird bei Diabetes mellitus Typ 2 eingesetzt. Er ist einer der am längsten verwendeten und bestuntersuchten Wirkstoffe in der oralen Diabetes-Therapie. Metformin gilt allgemein als gut verträglich, kann aber in seltenen Fällen besonders zu Therapiebeginn Magen-Darm-Beschwerden verursachen.

Das Qualitätsziel: Mindestens **70 %** der übergewichtigen Patienten unter antidiabetischer oraler Monotherapie erhalten Metformin.

Berücksichtigte Patienten: Alle übergewichtigen Patienten mit einem oralen Antidiabetikum als Monotherapie.

Im 1. Berichtshalbjahr wurden **20.543** von **23.790** Patienten (entspricht **86,4 %**) entsprechend der Vorgaben therapiert. Das Qualitätsziel wurde deutlich erreicht.

7.3.4 AUGENARZT

Um langfristige Folgeschäden zu vermeiden, sollten Diabetiker regelmäßig auf ophthalmologische Folgeerkrankungen hin untersucht werden und aus diesem Grunde sollte einmal im Jahr eine Funduskopie durchgeführt werden.

Das Qualitätsziel: Bei mindestens **90 %** der Patienten wurde eine augenärztliche Untersuchung in den letzten 24 Monaten durchgeführt.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Von **48.364** Patienten wurde bei **37.746** Patienten (entspricht **78,0 %**) eine Funduskopie durchgeführt.

Die Erreichung des Qualitätszieles wurde verfehlt.

Bei der Betrachtung dieses Ergebnisses sollte berücksichtigt werden, dass die koordinierenden Hausärzte die Terminabsprachen der Patienten mit den Augenarztpraxen nicht beeinflussen können.

7.3.5 DIABETISCHER FUSS

Ein wesentliches Element stellt die Fußinspektion bei der Behandlung von Typ 2-Diabetikern dar und sollte mindestens einmal jährlich durchgeführt werden. Ein auffälliger Fußbefund wird nach dem Wagner-Stadium und der Armstrong-Klassifikation dokumentiert.

Das Qualitätsziel: Bei mindestens **75 %** der Patienten mit auffälligem Fußstatus erfolgt die Mitbehandlung durch eine auf die Behandlung des diabetischen Fußes spezialisierte Einrichtung.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit auffälligem Fußstatus und Wagner 2-5 oder Armstrong C/D.

Dieses Ziel wurde verfehlt, denn **175** von **303** Patienten (entspricht **57,8 %**) mit auffälligem Fußstatus wurden in spezialisierten Einrichtungen behandelt. Somit wurde das Qualitätsziel verfehlt.

Hinweis: Die Auswertungsmethodik für dieses Qualitätsziel wurde angepasst. Patienten, die durch eine spezialisierte Fußeinrichtung koordinierend betreut werden, werden automatisch „überwiesen“ gewertet.

7.3.6 HbA_{1c}-WERT

Bei der Behandlung hat die Kontrolle des sog. Langzeit-Blutzuckerwertes (HbA_{1c}-Wert) eine zentrale Rolle. Jeder Prozentpunkt, den dieser näher an einen normoglykämischen Wert herangebracht werden kann, wirkt sich günstig auf den Krankheitsverlauf aus und senkt deutlich das Risiko von Folgeerkrankungen.

Das Qualitätsziel: Höchstens **10 %** der Patienten haben einen HbA_{1c}-Wert von $\geq 8,5 \%$ (69 mmol/mol)

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Im 1. Berichtshalbjahr hatten **8.357** von **73.321** Patienten (entspricht **11,4 %**) einen HbA_{1c}-Wert von $\geq 8,5 \%$.

Dieses Qualitätsziel wurde somit nur knapp verfehlt.

7.3.7 HbA_{1c}-ZIELWERT

Gemeinsam mit dem Patienten sind individuelle Therapieziele zu vereinbaren. Der HbA_{1c}-Wert ist ein zentraler Parameter für die langfristige Stoffwechselkontrolle und stellt neben dem Blutdruck einen wesentlichen Zielwert im Rahmen der individuellen Therapieplanung dar.

Das Qualitätsziel: Mindestens **60 %** der Patienten haben ihren individuell vereinbarten HbA_{1c}-Zielwert erreicht.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Im Bereich der KV Hamburg haben **37.862** von **57.951** Patienten (entspricht **65,3 %**) im 1. Berichtshalbjahr ihren individuell vereinbarten HbA_{1c}-Zielwert erreicht.

Das Qualitätsziel wurde somit gut erreicht.

7.3.8 BLUTDRUCK

Ein wesentlicher Parameter ist die Blutdruckeinstellung bei der individuellen Therapiezielplanung. Sie trägt zur Senkung des Mortalitätsrisikos bei und verringert somit die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung mikro- und makrovaskulärer Folgekomplikationen.

Das Qualitätsziel: Mindestens **45 %** der Patienten mit bekannter Hypertonie haben einen Blutdruck $\leq 139/89$ mmHg.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde.

Das Qualitätsziel wurde im 1. Berichtshalbjahr mit **54,7 % (30.655 von 56.051 Patienten)** erreicht.

7.3.9 NIERENFUNKTION

Die Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und einer langjährigen Hyperglykämie sowie unzureichend eingestellter Hypertonie haben in Abhängigkeit von ihrem Alter und ihrer Diabetesdauer ein unterschiedlich hohes Risiko für die Entwicklung einer diabetesspezifischen Nephropathie.

Das Qualitätsziel: Bei mindestens **90 %** der Patienten wurde die eGFR in den letzten 12 Monaten bestimmt.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Im 1. Berichtshalbjahr wurde das Qualitätsziel mit **86,9 % (50.367 von 57.951 Patienten)** nicht erreicht.

7.3.10 THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER

Grundsätzlich sollen alle Patienten mit makroangiopathischen Erkrankungen (z. B. kardio- und zerebrovaskulären Erkrankungen) - unter Beachtung der Kontraindikationen und/oder individueller Unverträglichkeiten - Thrombozytenaggregationshemmer (TAH) erhalten. Dies gilt insbesondere für Acetylsalicylsäure.

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten mit Makroangiopathie erhalten einen Thrombozytenaggregationshemmer.

Grundgesamtheit: Alle Patienten mit AVK, KHK, Schlaganfall, Herzinfarkt oder Amputation dokumentiert wurde und bei denen keine Kontraindikation vorliegt und/oder die keine orale Antioagulation erhalten.

Im 1. Berichtshalbjahr wurde bei **13.525 von 18.398** (entspricht **73,5 %**) Patienten ein TAH verordnet. Somit wurde das Qualitätsziel nicht erreicht.

7.3.11 SCHULUNGEN

Jeder Patient soll Zugang zu einem strukturierten, evaluierten, zielgruppenspezifischen und publizierten Schulungs- und Behandlungsprogramm erhalten. Patientenschulungen dienen der Befähigung der Patienten zur besseren Bewältigung des Krankheitsverlaufs und zur Befähigung zu informierten Patientenentscheidungen.

7.3.11.1 DIABETES-SCHULUNG (QUOTE)

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten hat im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen.

Grundgesamtheit: Alle Patienten.

Im 1. Berichtshalbjahr haben **22.458** von **70.583** (entspricht **31,8 %**) angesprochenen Patienten die empfohlene Schulung wahrgenommen.

7.3.11.2 HYPERTONIE-SCHULUNG (QUOTE)

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten mit Hypertonie hat im Rahmen des DMP an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen.

Grundgesamtheit: Alle Patienten mit bekannter Hypertonie.

Im 1. Berichtshalbjahr haben **8.672** von **56.051** Patienten (entspricht **15,5 %**) angesprochenen Patienten die empfohlene Schulung wahrgenommen.

7.3.12 ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend wird dargestellt, in welchen Fällen die Qualitätsziele erreicht (✓) oder nicht erreicht (✗) worden sind, bezogen auf das DMP Diabetes mellitus Typ 2. Zu den Schulungen konnte keine abschließende Aussage getroffen werden.

Diabetes mellitus Typ 2	
Hypoglykämie	✓
Notfallmäßige Stationäre Behandlung	✓
Metformin	✓
Augenarzt	✗

Diabetischer Fuss	x
HbA1c- Wert	x
HbA1c- Zielwert	✓
Blutdruck	✓
Nierenfunktion	x
Thrombozytenaggregationshemmer (TAH)	x

7.4 ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 2. BERICHTSHALBJAHR

7.4.1 HYPOGLYKÄMIE

Das Qualitätsziel: Weniger als **1 %** der Patienten mit zwei oder mehr notfallmäßigen Behandlungen von Hypoglykämien der letzten sechs Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Bei einer Grundgesamtheit von **56.540** wurde bei **250** Patienten eine schwere Hypoglykämie dokumentiert.

Mit **0,4 %** wurde das Qualitätsziel im Bereich der KV Hamburg klar erreicht.

7.4.2 NOTFALLMÄßIGE STATIONÄRE BEHANDLUNG

Das Qualitätsziel: Weniger als **1 %** der Patienten hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen Diabetes innerhalb der letzten sechs Monate.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Bei einer Grundgesamtheit von **62.216** im 2. Berichtshalbjahr wurden **115** Patienten (entspricht **0,2 %**) notfallmäßig stationär behandelt. Das Qualitätsziel wurde somit erreicht.

7.4.3 METFORMIN

Das Qualitätsziel: Mindestens **70 %** unter antidiabetischer oraler Monotherapie erhalten Metformin.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit einem oralen Antidiabetikum als Monotherapie.

Im 2. Berichtshalbjahr wurden **19.707** von **23.040** Patienten (entspricht **85,5 %**) entsprechend der Vorgaben therapiert. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

7.4.4 AUGENARZT

Das Qualitätsziel: Bei mindestens **90 %** der Patienten wurde eine augenärztliche Untersuchung in den letzten 12 Monaten durchgeführt.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Von **47.064** Patienten wurde bei **37.202** Patienten (entspricht **79,0 %**) eine Funduskopie durchgeführt.

Die Erreichung des Qualitätszieles wurde verfehlt.

Bei der Betrachtung dieses Ergebnisses sollte berücksichtigt werden, dass die koordinierenden Hausärzte die Terminabsprachen der Patienten mit den Augenarztpraxen nicht beeinflussen können.

7.4.5 DIABETISCHER FUSS

Dieses Qualitätsziel wurde im 2. Berichtshalbjahr nicht im Feedbackbericht aufgeführt.

7.4.6 HbA_{1c}-WERT

Das Qualitätsziel: Höchstens **10 %** der Patienten haben einen HbA_{1c}-Wert von > **8,5 %** (69 mmol/mol)

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Im 2. Berichtshalbjahr hatten **7.804** von **71.392** Patienten (entspricht **10,9 %**) einen HbA_{1c}-Wert von > **8,5 %**.

Dieses Qualitätsziel wurde nur sehr knapp verfehlt.

7.4.7 INDIVIDUELLER HbA_{1c}-ZIELWERT

Das Qualitätsziel: Mindestens **60 %** der Patienten haben ihren individuell vereinbarten HbA_{1c}-Zielwert erreicht.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP.

Im Bereich der KV Hamburg haben **37.534** von **56.540** Patienten (entspricht **66,4 %**) im 2. Berichtshalbjahr ihren individuell vereinbarten HbA_{1c}-Zielwert erreicht.

Das Qualitätsziel wurde gut erreicht.

7.4.8 BLUTDRUCK (RR ≤139/89 MMHG)

Das Qualitätsziel: Mindestens **45 %** der Patienten mit bekannter Hypertonie haben einen Blutdruck ≤ **139/89 mmHg**.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde.

Das Qualitätsziel wurde im 2. Berichtshalbjahr mit **53,1 % (29.043 von 54.691 Patienten)** erreicht.

7.4.9 NIERENFUNKTION

Dieses Qualitätsziel wurde im 2. Berichtshalbjahr nicht im Feedbackbericht aufgeführt.

7.4.10 THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten mit Makroangiopathie erhalten einen Thrombozytenaggregationshemmer.

Grundgesamtheit: Alle Patienten mit AVK, KHK, Schlaganfall, Herzinfarkt oder Amputation dokumentiert wurde und bei denen keine Kontraindikation vorliegt und/oder die keine orale Antioagulation erhalten.

Im 2. Berichtshalbjahr wurde bei **13.404** von **18.208** (entspricht **73,6 %**) Patienten ein TAH verordnet. Somit wurde das Qualitätsziel nicht erreicht.

7.4.11 SCHULUNGEN

7.4.10.1 DIABETES-SCHULUNG (QUOTE)

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten hat im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen.

Grundgesamtheit: Alle Patienten.

Im 2. Berichtshalbjahr konnten **8.680** von **54.691** Patienten (entspricht **15,9 %**) zu einer solchen Schulung motiviert werden.

7.4.10.2 HYPERTONIE-SCHULUNG (QUOTE)

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten mit Hypertonie hat im Rahmen des DMP an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen.

Grundgesamtheit: Alle Patienten mit bekannter Hypertonie.

Im 2. Berichtshalbjahr konnten **8.680** von **54.691** Patienten (entspricht **15,9 %**) zu einer solchen Schulung motiviert werden.

7.3.12 ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend wird dargestellt, in welchen Fällen die Qualitätsziele erreicht (✓) oder nicht erreicht (✗) worden sind, bezogen auf das DMP Diabetes mellitus Typ 2. Die Qualitätsziele Diabetischer Fuß und Nierenfunktion wurden im 2. Berichtshalbjahr nicht im Feedbackbericht aufgeführt, deswegen kann keine abschließende Beurteilung erfolgen. Zu den Schulungen konnte keine abschließende Aussage getroffen werden.


Diabetes mellitus Typ 2	
Hypoglykämie	✓
Notfallmäßige Stationäre Behandlung	✓
Metformin	✓
Augenarzt	✗
Diabetischer Fuß	-
HbA1c- Wert	✗
HbA1c- Zielwert	✓
Blutdruck	✓
Nierenfunktion	-
Thrombozytenaggregationshemmer (TAH)	✗

7.5 LÄNGSSCHNITTDARSTELLUNG

Für die Längsschnittauswertung werden die Dokumentationen herangezogen, die vom 1. Juli 2003 bis 31. Dezember 2018 vorliegen. In der verlaufsbezogenen Darstellung werden Werte repräsentiert, die die Patienten nach der jeweils angegebenen DMP-Teilnahmedauer aufweisen. Die längsschnittliche Betrachtungsweise erlaubt es, Rückschlüsse auf die Morbiditätsentwicklung und den Programmerfolg zu ziehen.


7.5.1 HbA1C-WERTEKLASSEN

Von allen Patienten, die drei Jahre am DMP Diabetes mellitus Typ 2 teilnehmen, weisen **9,4 %** einen HbA1c-Wert von **> 8,5 %** auf. Bei einer Teilnahmedauer von über **7 Jahren** haben **12,2 %** der Patienten einen HbA1c-Wert von **> 8,5 %**.



7.5.2 BLUTDRUCK-WERTEKLASSEN

Von allen Patienten mit einer Hypertonie, die drei Jahre am DMP teilnehmen, weisen **54,9 %** normotone Blutdruckwerte ($\leq 139/89$ mmHg) auf. Bei einer Teilnahmedauer von über **7 Jahren**, haben **56,0 %** der Patienten normotone Blutdruckwerte.



8 KORONARE HERZKRANKHEIT EINSCHLIESSLICH DES MODULS CHRONISCHE HERZINSUFFIZIENZ

8.1 ZIELE IM DMP KHK EINSCHLIESSLICH DES MODULS CHRONISCHE HERZINSUFFIZIENZ

Herzkrankheiten mit Minderdurchblutung der Koronargefäße (KHK) gelten als die häufigste Todesursache in den westlichen Industrieländern. Beeinflussbare Ursachen der KHK liegen in bestimmten häufigen Eigenschaften der Lebensform wie Fehlernährung, Übergewicht, Rauchen und mangelnder körperlichen Betätigung.

Die KHK gilt gleichzeitig als schwerwiegende Folgeerkrankung der Stoffwechselstörung des Diabetes mellitus bei nicht adäquater Behandlung. Neben dem Bluthochdruck ist die koronare Herzkrankheit die Hauptursache der chronischen Herzinsuffizienz.

Eine koronare Herzkrankheit ist mit einem erhöhten Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko verbunden. Bei häufigem Auftreten von Angina pectoris-Beschwerden ist die Lebensqualität vermindert. Daraus ergeben sich folgende Therapieziele:

- Reduktion der Sterblichkeit
- Reduktion der kardiovaskulären Morbidität, insbesondere Vermeidung von Herzinfarkten und der Entwicklung einer Herzinsuffizienz bzw. Vermeidung/Verlangsamung einer Progression der bestehenden kardialen Funktionsstörung
- Steigerung der Lebensqualität durch Vermeidung von Angina pectoris-Beschwerden sowie Hospitalisationen und Steigerung/Erhaltung der Belastungsfähigkeit

Im Rahmen der Vereinbarung werden Regelungen für die vertragsärztliche Versorgung von Patienten mit KHK mit oder ohne gleichzeitiger chronischer Herzinsuffizienz einschließlich der Schnittstellen innerhalb der ärztlichen Versorgungskette und zu der versichernden Krankenkasse definiert, um eine der individuellen Situation des Versicherten angepasste Versorgung zu gewährleisten. Es ist vorrangiges Ziel der Vereinbarung, mögliche Bereiche der Über-, Unter- und Fehlversorgung zu identifizieren und ggf. abzubauen.

8.2 DATEN ZU DEN TEILNEHMENDEN LEISTUNGSERBRINGERN, DEN TEILNEHMENDEN PATIENTEN UND DEN ÜBERMITTELTEN DOKUMENTATIONEN

8.2.1 DATEN ZU TEILNEHMENDEN LEISTUNGSERBRINGERN

Im ambulanten Sektor nehmen **820** Hausärzte, **35** kardiologisch qualifizierte Ärzte bzw. ambulante Einrichtungen sowie **22** invasiv tätige ambulante Kardiologen am DMP KHK teil.

Bei der jährlichen Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen haben **14** Hausärzte die erforderlichen Nachweise nicht erbracht.

Im stationären Sektor sind **4** Krankenhäuser und **eine** Rehabilitationsklinik in den Vertrag eingebunden.

8.2.2 DATEN ZU TEILNEHMENDEN PATIENTEN

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 sind **29.042** Patienten in das DMP Koronare Herzkrankheit eingeschrieben.

Durchschnittlich sind die Patienten **72** Jahre alt. Wie sich die Altersstruktur der Patienten verteilt, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:



8.2.3 DATEN ZU ÜBERMITTELTEN DOKUMENTATIONEN

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2018 liegen für **29.598** Patienten Dokumentationen vor. Davon **2.038** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **27.560** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation. Von den DMP-Teilnehmern nehmen ferner **1.743** Patienten am Modul Herzinsuffizienz teil, davon **126** Patienten nur mit einer Erstdokumentation und **1.617** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation in diesem Modul.

Im Berichtszeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2018 liegen für **29.158** Patienten Dokumentationen vor. Davon **2.057** Patienten, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und **27.101** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation. Von den DMP-Teilnehmern nehmen ferner **1.747** Patienten am Modul Herzinsuffizienz teil, davon **147** Patienten nur mit einer Erstdokumentation und **1.600** Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation in diesem Modul.

8.3 ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 1. HALBJAHR

8.3.1 THERAPIE MIT THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMERN (TAH)

Grundsätzlich sollen alle Patienten mit chronischer KHK unter strikter Beachtung von Kontraindikationen und/oder Unverträglichkeiten Thrombozytenaggregationshemmer (TAH) verordnet bekommen.

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten erhalten Thrombozytenaggregationshemmer.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, bei denen keine Kontraindikation vorliegt und/oder die keine orale Antikoagulation erhalten.

Im 1. Berichtshalbjahr wurde **89,0 %** der Patienten (**23.113** von **25.967** Patienten) ein TAH verordnet.

8.3.2 THERAPIE MIT BETABLOCKERN

Für die Behandlung der chronischen KHK, insbesondere nach akutem Myokardinfarkt, sind Betablocker hinsichtlich der in der RSAV genannten Therapieziele Mittel der ersten Wahl, auch bei relativen Kontraindikationen.

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten erhalten Betablocker.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, bei denen keine Kontraindikation vorliegt.

Im 1. Berichtshalbjahr wurden **77,0 %** der Patienten (**21.906** von **28.467** Patienten) ein Betablocker verordnet. Das Qualitätsziel wurde verfehlt.

8.3.3 THERAPIE MIT HMG-COA-REDUKTASE-HEMMERN (STATINE)

Für die Therapie der chronischen KHK sollten HMG-CoA-Reduktasehemmer (Statine) erwogen werden, für die eine morbiditäts- und mortalitätssenkende Wirkung nachgewiesen ist.

Das Qualitätsziel: Mindestens **60 %** der Patienten erhalten Statine.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, bei denen keine Kontraindikation vorliegt

Es wurden im 1. Berichtshalbjahr **24.612** von **29.097** der Patienten (entspricht **84,6 %**) Statine verordnet, so dass das Qualitätsziel übertroffen wurde.

8.3.4 BLUTDRUCK

Die Blutdruckeinstellung ist einer der wesentlichen Parameter bei der individuellen Therapiezielplanung und trägt zur Senkung des Mortalitätsrisikos bei. Weiterhin vermindert sie die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung mikro- und makrovaskulärer Folgekomplikationen.

Das Qualitätsziel: Mindestens **50 %** der Patienten mit bekannter Hypertonie haben einen Blutdruck $\leq 139/89$ mmHg.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde.

Im 1. Berichtshalbjahr wiesen **61,9 %** (**15.716** von **25.399** Patienten) der Patienten mit bekannter Hypertonie normotensive Werte ($\leq 139/89$ mmHg) auf.

Das Qualitätsziel wurde somit erreicht.

8.3.5 RAUCHERENTWÖHNUNG

Das Qualitätsziel: Ein niedriger Anteil der Patienten, die zum Zeitpunkt der Einschreibung Raucher waren, raucht noch.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, die bei der Erstdokumentation Raucher waren und für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt.

Im 1. Berichtshalbjahr beträgt der Anteil an Patienten, die bei der Einschreibung Raucher waren und noch immer rauchen **80,5 %** (entspricht **2.993** von **3.716** der Patienten).


8.3.6 RAUCHERQUOTE

Die Aufklärung des Patienten über die besonderen Risiken des Rauchens für Patienten mit KHK ist für die Patienten ein Qualitätsziel. Außerdem soll der Arzt im Rahmen der Therapie die dringende Empfehlung aussprechen, das Rauchen aufzugeben. Der Raucherstatus soll bei jedem Patienten bei der Konsultation erfragt und die Raucher zur Raucherentwöhnung motiviert werden.

Das Qualitätsziel: Niedriger Anteil der Patienten raucht.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Im 1. Berichtshalbjahr beträgt der Anteil an rauchenden Patienten **15,4 %** (entspricht **4.560** von **29.598** der Patienten).




8.3.7 ANGINA-PECTORIS-BESCHWERDEN

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten hat keine Angina-pectoris-Beschwerden.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten

Im 1. Berichtshalbjahr beträgt der Anteil an Patienten die keine Angina-pectoris-Beschwerden haben **95,5 %** (entspricht **28,273** von **29.598** der Patienten).

Diese Übersicht zeigt Ihnen, wie die Angina-pectoris-Beschwerden bei den Patienten nach der CCS-Klassifikation verteilt sind.



8.3.8 SCHULUNGEN

Patientenschulungen dienen der Befähigung der Patienten zur besseren Bewältigung des Krankheitsverlaufs. Im Rahmen des strukturierten Behandlungsprogramms prüft der Arzt unter Berücksichtigung bestehender Folge- und Begleiterkrankungen, ob der Patient von strukturierten, evaluierten, zielgruppenspezifischen (z. B. Antikoagulation, Diabetes mellitus, Hypertonie) und publizierten Schulungs- und Behandlungsprogrammen profitieren kann, wobei der bestehende Schulungsstand des Patienten zu berücksichtigen ist. Der Patient wird von seiner Krankenkasse aus dem DMP ausgeschrieben, wenn er innerhalb von zwölf Monaten zwei der veranlassten Schulungen ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen hat.

8.3.8.1 DIABETES-SCHULUNG (QUOTE)

Das neue Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten mit bekanntem Diabetes hat im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit bekanntem Diabetes mellitus.

Im 1. Berichtshalbjahr haben **1.405** von **11.938** Patienten (**11,8 %**) an einer Diabetes-Schulung teilgenommen.

8.3.8.2 HYPERTONIE-SCHULUNG (QUOTE)

Das neue Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten mit bekannter Hypertonie hat im Rahmen des DMP an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit bekannter Hypertonie.

Im 1. Berichtshalbjahr haben **1.670** von **25.484** Patienten (**6,6 %**) an einer empfohlenen Hypertonie-Schulung teilgenommen.

8.3.9. ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend wird dargestellt, in welchen Fällen die Qualitätsziele erreicht (✓) oder nicht erreicht (✗) worden sind, bezogen auf das DMP Koronare Herzkrankheiten. Die Qualitätsziele Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern (TAH), Raucherentwöhnung, Raucherquote, Angina-Pectoris-Beschwerden, Diabetes- Schulung (Quote) und Hypertonie-Schulung (Quote) kann keine abschließende Beurteilung erfolgen.

DMP Koronare Herzkrankheiten	
Therapie mit Betablockern	✗
Therapie mit HMG-CoA-Reduktase-Hemmern	✓
Blutdruck	✓

8.4 ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 2. HALBJAHR

8.4.1 THERAPIE MIT THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMERN (TAH)

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten erhalten Thrombozytenaggregationshemmer.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, bei denen keine Kontraindikation vorliegt und/oder die keine orale Antikoagulation erhalten.

Im 2. Berichtshalbjahr wurde **89,5 %** der Patienten (**22.676** von **25.336** Patienten) ein TAH verordnet.

8.4.2 THERAPIE MIT BETABLOCKERN

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten erhalten Betablocker.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, bei denen keine Kontraindikation vorliegt.

Im 2. Berichtshalbjahr wurden **77,0 %** der Patienten (**21.538** von **27.983** Patienten) ein Betablocker verordnet. Das Qualitätsziel wurde verfehlt.

8.4.3 THERAPIE MIT HMG-COA-REDUKTASE-HEMMERN (STATINE)

Das Qualitätsziel: Mindestens **60 %** der Patienten erhalten Statine.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, bei denen keine Kontraindikation vorliegt

Es wurden im 2. Berichtshalbjahr **24.166** von **28.568** der Patienten (entspricht **84,6 %**) Statine verordnet, so dass das Qualitätsziel übertroffen wurde.

8.4.4 BLUTDRUCK

Das Qualitätsziel: Mindestens **50 %** der Patienten mit bekannter Hypertonie haben einen Blutdruck $\leq 139/89$ mmHg.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde.

Im 2. Berichtshalbjahr wiesen **62,5 % (15.594 von 24.941 Patienten)** der Patienten mit bekannter Hypertonie normotensive Werte ($\leq 139/89$ mmHg) auf.

Das Qualitätsziel wurde somit erreicht.

8.4.5 RAUCHERENTWÖHNUNG

Das Qualitätsziel: Ein niedriger Anteil der Patienten, die zum Zeitpunkt der Einschreibung Raucher waren, raucht noch.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten, die bei der Erstdokumentation Raucher waren und für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt.

Im 2. Berichtshalbjahr beträgt der Anteil an Patienten, die bei der Einschreibung Raucher waren und noch immer rauchen **80,9 %** (entspricht **3.041 von 3.759** der Patienten).


8.4.6 RAUCHERQUOTE

Die Aufklärung des Patienten über die besonderen Risiken des Rauchens für Patienten mit KHK ist für die Patienten ein Qualitätsziel. Außerdem soll der Arzt im Rahmen der Therapie die dringende Empfehlung aussprechen, das Rauchen aufzugeben. Der Raucherstatus soll bei jedem Patienten bei der Konsultation erfragt und die Raucher zur Raucherentwöhnung motiviert werden.

Das Qualitätsziel: Niedriger Anteil der Patienten raucht.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten.

Im 2. Berichtshalbjahr beträgt der Anteil an rauchenden Patienten **15,5 %** (entspricht **4.503 von 29.042** der Patienten).




8.4.7 ANGINA-PECTORIS-BESCHWERDEN

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten hat keine Angina-pectoris-Beschwerden.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten

Im 2. Berichtshalbjahr beträgt der Anteil an Patienten die keine Angina-pectoris-Beschwerden haben **95,6 %** (entspricht **27.772** von **29.042** der Patienten).

Diese Übersicht zeigt Ihnen, wie die Angina-pectoris-Beschwerden bei den Patienten nach der CCS-Klassifikation verteilt sind.



8.4.8 SCHULUNGEN

8.4.8.1 DIABETES-SCHULUNG (QUOTE)

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten mit bekanntem Diabetes hat im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit bekanntem Diabetes mellitus.

Im 2. Berichtshalbjahr haben **1.450** von **11.649** Patienten (**12,4 %**) an einer Diabetes-Schulung teilgenommen.

8.4.8.2 HYPERTONIE-SCHULUNG (QUOTE)

Das Qualitätsziel: Ein hoher Anteil der Patienten mit bekannter Hypertonie hat im Rahmen des DMP an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit bekannter Hypertonie.

Im 2. Berichtshalbjahr haben **1.939** von **24.941** Patienten (**7,8 %**) an einer empfohlenen Hypertonie-Schulung teilgenommen.

8.4.9 ZUSAMMENFASSUNG


Zusammenfassend wird dargestellt, in welchen Fällen die Qualitätsziele erreicht (✓) oder nicht erreicht (✗) worden sind, bezogen auf das DMP Koronare Herzkrankheiten. Die Qualitätsziele Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern (TAH), Raucherentwöhnung, Raucherquote, Angina-Pectoris-Beschwerden, Diabetes- Schulung (Quote) und Hypertonie-Schulung (Quote) kann keine abschließende Beurteilung erfolgen.

DMP Koronare Herzkrankheiten	
Therapie mit Betablockern	✗
Therapie mit HMG-CoA-Reduktase-Hemmern	✓
Blutdruck	✓


8.5 LÄNGSSCHNITTDARSTELLUNG DER BLUTDRUCK-WERTEKLASSEN

Die nachstehende Abbildung zeigt die Anteile und Anzahl der Patienten mit Hypertonie, differenziert nach Blutdruckwerteklassen. Die Säulen repräsentieren Werte, die die Patienten nach der jeweils angegebenen DMP-Teilnahmedauer aufwiesen. In der entsprechenden Säule „1J“ sind alle jemals von Patienten nach einem Jahr DMP-Teilnahme gemessenen Werte aufgeführt. Die entsprechend erhobenen Werte eines Patienten gehen darum in der Regel - abhängig von der Dauer seiner DMP-Teilnahme - in mehrere Säulen ein.

Ergebnisse des 1. Berichtshalbjahres:



Ergebnisse des 2. Berichtshalbjahres:



8.6 MODUL HERZINSUFFIZIENZ

8.6.1 ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 1. HALBJAHR

8.6.1.1 THERAPIE MIT ACE-HEMMERN

Alle Patienten sollten unabhängig vom Schweregrad der Herzinsuffizienz eine Therapie mit Angiotensin-Conversions-Enzym-Hemmern (ACE-Hemmer) erhalten, da eine Behandlung mit ACE-Hemmern Prognose und Symptomatik der Erkrankung verbessert.

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten erhalten ACE-Hemmer.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit Teilnahme am Modul Herzinsuffizienz, bei denen keine Kontraindikation vorliegt und die keinen AT1-Rezeptorantagonisten erhalten.

Es wurden im 1. Berichtshalbjahr **77,8 %** der Patienten (**1.171** von **1.505** Patienten) ein ACE-Hemmer verordnet. Das Qualitätsziel wurde knapp verfehlt.

8.6.1.2 THERAPIE MIT BETABLOCKERN

Alle klinisch stabilen Patienten mit einer chronischen Herzinsuffizienz sollten einen Betablocker erhalten.

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten erhalten.

Berücksichtigte Patienten: Alle eingeschriebenen Patienten mit Teilnahme am Modul Herzinsuffizienz, bei denen keine Kontraindikation vorliegt.

Im 1. Berichtshalbjahr wurde **80,5 %** der Patienten (**1.353** von **1.680** Patienten) ein Betablocker verordnet und das Qualitätsziel erreicht.

8.6.1.3 SERUM-ELEKTROLYTE-BESTIMMUNG

Das Qualitätsziel: Bei einem hohen Anteil der Patienten wurden die Serum-Elektrolyte in den letzten 12 Monaten bestimmt.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am Modul Herzinsuffizienz.

Im 1. Berichtshalbjahr wurde bei **1.305** von **1.882** Patienten (entspricht **69,3 %**) eine Bestimmung des Serum-Elektrolyte-Haushaltes durchgeführt.

8.6.2 ERGEBNISSE DER QUALITÄTSZIELE IM 2. HALBJAHR

8.6.2.1 THERAPIE MIT ACE-HEMMERN

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten erhalten ACE-Hemmer.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit Teilnahme am Modul Herzinsuffizienz, bei denen keine Kontraindikation vorliegt und die keinen AT1-Rezeptorantagonisten erhalten.

Im 2. Berichtshalbjahr wurden bei **77,3 %** der Patienten (**1.157** von **1.496** Patienten) ACE-Hemmer verordnet, somit wurde das Qualitätsziel verfehlt.

8.6.2.2 THERAPIE MIT BETABLOCKERN

Das Qualitätsziel: Mindestens **80 %** der Patienten erhalten.

Berücksichtigte Patienten: Alle eingeschriebenen Patienten mit Teilnahme am Modul Herzinsuffizienz, bei denen keine Kontraindikation vorliegt.

Im 2. Berichtshalbjahr wurde das Qualitätsziel erfüllt. Es wurden **81,4 %** (**1.380** von **1.696** Patienten) der Patienten ein Betablocker verordnet.

8.6.2.3 SERUM-ELEKTROLYTE-BESTIMMUNG

Das Qualitätsziel: Bei einem hohen Anteil der Patienten wurden die Serum-Elektrolyte in den letzten 12 Monaten bestimmt.

Berücksichtigte Patienten: Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am Modul Herzinsuffizienz.

Im 2. Berichtshalbjahr wurden bei **70,7 %** (**1.392** von **1.969** Patienten) der Patienten die Serum-Elektrolyte bestimmt.

8.6.3 ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend wird dargestellt, in welchen Fällen die Qualitätsziele erreicht (✓) oder nicht erreicht (✗) worden sind, bezogen auf das Modul Herzinsuffizienz. Für das Qualitätsziel Serum-Elektrolyte-Bestimmung kann keine abschließende Beurteilung erfolgen.

	1. Halbjahr	2. Halbjahr
Therapie mit ACE-Hemmern	✗	
Therapie mit Betablockern	✓	